


話しながら使える
貼り付くトローチ

咳やたんを
おさえる

ぴたっと

PITAS

—ピタス—



実物大



移動中



会議中



鑑賞中

販売名:
ピタスせきトローチ

セルフメディケーション

第2類医薬品

税 控除 対象

第2類医薬品

販売名:ピタスセキトローチ
 特徴●口腔内殺菌成分・セチルピリジニウム塩化物水和物を配合しており、のどの炎症によるのどの痛み・はれを抑えます。●鎮咳成分・フェノールフタリン酸デキストロメトルフアンが咳中枢にはたらい、つらい咳を抑えます。

⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
3. 使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと(眠気等があらわれることがある。)

👤 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 次の症状のある人。高熱
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
呼吸器	息苦しさ、息切れ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 使用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。眠気
4. 5~6回使用しても症状がよくなる場合使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

S231005 副作用被害救済制度 TEL 0120-149-931

使用に際してはこの説明書をよく読み、本剤とともに保管してください。

[保管及び取扱い上の注意]
 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
 (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
 (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
 (4) アルミ袋開封後はすみやかに使用すること。
 (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

[効能・効果] せき、たん、のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ

[用法・用量] 次の量を口中に含み、かまずにゆっくり溶かして使用すること。

年齢	1回量	1日使用回数	使用間隔
成人(15歳以上)	1個	6回	2時間以上
15歳未満	使用しないこと。		

<用法・用量に関連する注意>


- (1) 定められた用法・用量を厳守すること。
- (2) かんだり、のみこんだりしないこと。

[成分] 6個(1日使用量)中

成分	含量
フェノールフタリン酸デキストロメトルフアン	60mg
グアヤコールスルホン酸カリウム	140mg
セチルピリジニウム塩化物水和物	6mg

添加物:ヒドロキシプロピルセルロース、ポビドン、プルラン、マクロゴール、l-メントール、タンニン酸、D-ソルビトール、サッカリンNa、ショ糖脂肪酸エステル、スクラロース、銅クロロフィリンNa、香料

<のみこまないために>*使用例



舌にのせ、口を閉じ、上あごに貼る等により口中でゆっくり溶かしてください

製造販売元



大鵬薬品工業株式会社
 東京都千代田区神田錦町1-27
 お客様相談室 TEL.0120-4527-66
<https://www.taiho.co.jp/>