

matsu
kiyo

ぶり返してつらい

首元、お腹周り、ひじ・ひざの内側、下着かぶれに

汗などによるかゆみ・かぶれに

お肌のための汗かぶれ治療薬

べたつかないクリーム



MEDIVEIL⁺

Designed to Protect Bare Skin

PRICKLY
HEAT
CREAM

02

鎮痒消炎薬 第②類医薬品

MV デオEXクリーム

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください(1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。(2)目の周囲、粘膜等。2. 顔面には、広範囲に使用しないでください 3. 長期連用しないでください




相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4)患部が広範囲の人。(5)湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

Antipruritic & Anti-Inflammatory Agent

Cream containing a steroid, effective against itching, eczema, and rash caused by perspiration, etc.

効能・効果

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。[用法・用量に関連する注意](1)定められた用法・用量を守ってください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4)外用にのみ使用してください。

成分・分量 (100g中)

プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル(PVA)...	0.15g	添加物として、パルミチン酸イソプロピル、白色ワセリン、ベヘニルアルコール、ステアリルアルコール、セタノール、モノステアリン酸グリセリン、セトマクロゴール1000、ジイソプロパノールアミン、ジメチルポリシロキサン、パラベン、ジブチルヒドロキシルエンを含有します。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.0g	
l-メントール	3.5g	
dl-カンフル	1.0g	
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	
クロタミトン	5.0g	

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わります。)(4)本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。(5)メガネ、時計、アクセサリー、プラスチック類、化繊製品、皮革製品、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。(6)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用してください。

万協製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0598-30-5376

受付時間 10:00~17:00

(ただし、土、日、祝日は除きます。)

※この商品は(株)マツキヨココカラ&カンパニーのオリジナル商品です。

セルフメディケーション

税 控除 対象

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元 万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五柱1169-142