

matsu
kiyo

しっとり保湿クリーム

赤みや盛り上がりが残った状態の

傷あと・打ち身による青あざに

お肌のための傷あと・打ち身による青あざ治療薬



MEDIVEIL⁺

Designed to Protect Bare Skin

SCAR
TREATMENT
CREAM

05

外皮用薬

第2類医薬品

MV HPスキンクリーム

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人。
- (2) わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人。(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがあります)

2. 次の部位には使用しないでください。

目、粘膜(口腔、鼻腔、膣など)



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

Topical Medication

Four active ingredients work effectively to improve the appearance of scars with lingering redness and raised areas.

効能・効果

乾皮症、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、小児の乾燥性皮ふ、手指の荒れ、手足のひび・あかぎれ、しもやけ(ただれを除く)、きず・やけどのあとの皮ふのしこり・つっぱり(顔面を除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

用法・用量

1日1~数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼなどにのばして貼る。[用法・用量に関連する注意] (1) 定められた用法・用量を守ってください。(2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(3) 外用にのみ使用してください。※出血のある傷口には使用しないでください。(血が止まりにくくなる場合があります) ※顔面にある傷あと、やけどのあとには使用しないでください。(4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

成分・分量(100g中)

ヘパリン類似物質.....0.3g	添加物:流動パラフィン、1,3-ブチレングリコール、セタノール、パルミチン酸イソプロピル、モノステアリン酸ソルビタン、カルボキシビニルポリマー、2,2',2"-
グリチルリチン酸二カリウム.....0.5g	ニトリロトリエタノール、エデト酸Na水和物、ジブチル
トコフェロール酢酸エステル.....0.5g	ヒドロキシトルエン、ポリソルベート60、パラベン
パンテノール.....1.0g	

保管及び取扱い上の注意

(1) 本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないでください。(2) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(3) 小児の手の届かない所に保管してください。(4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります) (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

万協製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0598-30-5376

受付時間 10:00~17:00

(ただし、土、日、祝日は除きます。)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元 万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂1169-142