

第3類医薬品

〈殺菌消毒薬〉

新 化膿を防ぐ

タマガワ  
リバガーゼ®A

アクリノール0.4%液含浸ガーゼ

油紙  
ピンセット  
入り

外用/ガーゼサイズ:8cm×5cm

販売名:タマガワ新リバガーゼA

第3類医薬品

効能・効果

切傷・擦過傷(すり傷)・化膿性創傷

成分・分量 1.2g中

アクリノール水和物0.4%液……………1.0g

ガーゼ……………0.2g

添加物 グリセリン

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。  
(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 衣類に付着すると黄色に着色し、脱色しにくいので、注意すること。
- (5) 使用期限のすぎた製品は使用しないこと。(箱側面に記載)

玉川衛材(株)お客様相談窓口  
TEL.03-3861-2037  
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝を除く)

製造販売元

タマガワ  
エーザイ

<GI-SG>

副作用被害救済制度  
TEL.0120-149-931

東京都千代田区岩本町2-2-16

<http://www.tamagawa-eizai.co.jp>

第3類医薬品

傷口をソフトに包んで化膿を防ぐ

〈殺菌消毒薬〉

タマガワ  
新リバガーゼ®A

SHIN-RIBAGAUZE A

### △使用上の注意

#### ■相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (3) 患部が広範囲の人
  - (4) 深い傷やひどいやけどの人
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症状        |
|------|-----------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ |

- 5～6日使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

#### 用法・用量

ピンセットでガーゼを取り、患部に貼付して油紙を当て、軽くホータイをして下さい。1日1回交換

#### 用法及び用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用すること。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3) 外用にのみ使用すること。
- (4) 患部を清潔にし、ガーゼ部分を汚さないように注意して使用すること。