

Baby
HEALTH
CARE

6

カ月頃から

pigeon

ピジョン

胸・のど・背中にぬる

鼻づまり 改善薬

鼻づまり・くしゃみなど

かぜに伴う
諸症状を
緩和

す〜っとのびて
べたつかない！

衣服につきにくい
クリームタイプ

指定医薬部外品

ご使用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

〈効能・効果〉 鼻づまり、くしゃみ等のかぜに伴う諸症状の緩和

〈用法・用量〉 むね、のど又は背中に対して、適量塗布する。

〈使い方〉 1.手(指)に取る。
2.むね、のど又は背中にまんべんなく塗る。

〈1回量の目安〉(しぼり出したとき、3.5cmが約1gです。)

年齢	6ヵ月～1才	2～4才	5～9才	10～14才	15才以上
1回量	0.5～2g	1～3g	1.5～4g	2～5g	3～6g

- 1.定められた用法・用量をよく守ってください。
- 2.小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 3.目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに清潔な水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けてください。
- 4.本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。口に入ってしまった場合には、吐かせずに口の中のものを取り除いて口をすすいでください。お子様がいつもと様子が違う場合、すぐに医療機関の受診をお願いします。

〈成分・分量〉(100g中)

dl-カンフル…5.0g、テレピン油…5.0g、l-メントール…3.0g、ユーカリ油…2.0g、ニクズク油…1.2g、ワイキョウ油…0.5g 添加物としてポリソルベート60、エデト酸Na、カルボキシビニルポリマー、ジイソプロパノールアミン、ステアリアルアルコール、ステアリン酸、流動パラフィン、1,3-ブチレンジグリコールを含有します。

〈使用上の注意〉

本剤はかぜに伴う鼻づまりやくしゃみ等の諸症状を緩和するものであり、熱を下げることを目的として使用するものではありません。

●してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。) 次の部位には使用しないでください。

- 1.目や目の周囲、粘膜(例えば口腔、鼻腔、傷口)等。
- 2.あせも、キズ、はれもの、湿疹等異常のある部位。

●相談すること

- 1.次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人。(2)本人又は家族がアレルギー体質の人。(3)今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。(4)熱がある人又は症状が長びいている人。(5)6ヵ月未満の乳幼児。(6)全身又は広範囲に創傷やただれのある人。
- 2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師又は薬剤師に相談してください。
(1)使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診断を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

- (2)5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

〈保管及び取扱上の注意〉

- 1.高温を避け、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 2.小児の手の届かない所に保管してください。
特にキャップの誤飲にご注意ください。
- 3.他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。)
- 4.使用期限(ケース及びチューブに西暦と月を記載)を過ぎた商品は使用しないでください。