

第2類医薬品

下 剤

日本薬局方

加香ヒマシ油

Aromatic Castor Oil

腸内容物の急速な排除に

ご使用に際して、外箱の説明文
を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大
切に保存してください。

第2類医薬品

日本薬局方 加香ヒマシ油



使用上の注意



してはいけ
ないこと (守らないと現在の
症状が悪化したり、
副作用が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないでください
(1) はげしい腹痛又は吐き気・嘔吐のある人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 3歳未満の乳幼児。(4) 防虫剤(ナフタリン等)、殺そ剤(猫イラズ等)等の薬剤を誤って服用した人。(このような場合は、直ちに医師の治療を受けてください。)
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
駆虫薬、他の瀉下薬(下剤)
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、
本剤を服用する場合は授乳を避けてください
- 連用しないでください

* 以下右側面へ

* 使用上の注意のつづき

相談する
こと

1. 次の人は服用前に
医師、薬剤師又は登録
販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬
などによりアレルギー症状を起こした
ことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合
は副作用の可能性があるので、直ち
に服用を中止し、この外箱を持って
医師、薬剤師又は登録販売者に相談
してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれること
があるので、このような症状の持続
又は増強が見られた場合には、服用
を中止し、医師、薬剤師又は登録販
売者に相談してください

下 痢

〔用法用量〕

本剤は、下記用量を1日1回を限度と
して、必要時、そのまま又は水、牛乳
などに浮かべて服用してください。

大人(15歳以上) 20 mL

11歳以上15歳未満 13 mL

7歳以上11歳未満 10 mL

3歳以上 7歳未満 6 mL

* 以下右側面へ

* 〔用法用量〕のつづき

〔用法用量に関連する注意〕

(1) 用法用量を厳守してください。(2)
小児に服用させる場合には、保護者の
指導監督のもとに服用させてください。
(3) 就寝前の服用を避けてください。

〔効能効果〕

腸内容物の急速な排除(食あたり等)

〔成分分量〕1 mL中

ヒマシ油 0.99 mL含有

添加物：オレンジ油、ハッカ油

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に
密栓して保管してください。(2) 小児
の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでくださ
い。(誤用の原因になったり品質が変
わる場合があります。)(4) 火気に近
づけないでください。(5) 使用期限を
過ぎた製品は服用しないでください。

(添付のコップは10 mLです。)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)