



### 【使用方法】



②「アー」と声を出しながら頭部を押して、患部に薬液を2～3回直射してください。

※最初は液が出るまで4～5回押してください。

※薬液がノズルの先端にたまった時は、液だれを防ぐため清潔なティッシュペーパー等で拭き取ってください。



③使用後は、フタをもとの位置にはめてください。



ノズルの先端を針等で突くと薬液が出なくなったり、折れた時大変危険です。絶対におやめください。

Throat Spray  
パープルショット  
matsu  
kiyo

## のどの炎症による のどの痛み



### 薬のはたらき

のどの痛み

のどの不快感

口内炎

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物:0.2mg

・のどの痛みやはれの原因である炎症をおさえる

1mL中

口腔咽喉薬

第3類医薬品

### 効能・効果

のどの炎症によるのどあれ・のどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・声がれ、口内炎

### 成分・分量 1mL中

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物(水溶性アズレン)……………0.2mg

添加物としてグリセリン、還元麦芽糖水アメ、プロピレングリコール、クエン酸、クエン酸Na、エタノール、パラベン、ℓ-メントール、pH調整剤、香料を含有する。

### 保管及び取り扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。)(4)薬液が衣服等に付着すると着色します。付着した場合はすぐに水でよく洗い落としてください。(5)ノズルの先端の穴を針等で突かないでください。使用時に薬液が出にくくなる場合があります。(6)火気に近づけないでください。(7)使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。(8)本品使用後の一定時間は、呼気中に酒気帯び運転と判定される濃度以上のアルコール濃度が検出される可能性がありますので、運転中のご使用はお控えください。

発売元 白金製薬株式会社  
〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515

お客様相談室 TEL:0744-21-5588  
受付時間 9:00~17:00  
(土日祝日・年末年始・夏季など特別休業日を除く)

製造 ダイヤ製薬株式会社  
販売元 〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931

※この商品は(株)マツキヨココカラ&カンパニーのオリジナル商品です。

パープルショット

第3類  
医薬品

### こんな方におすすめ

- のどの炎症によるのどあれ、のどの痛みでお困りの方
- 口内炎でお困りの方
- のどの不快感を抑えたい方

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

### 使用上の注意

#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。  
(2) 口内のただれがひどい人。  
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮ふ又は口腔	発疹・発赤、かゆみ又は刺激感

- (1) 症状が悪化した場合。  
3.5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 用法・用量

1日数回、適量を患部に噴射塗布してください。

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 息を吸いこみながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、ノズルをのどの患部にむけて、軽く息をはきながら、2～3回噴射してください。
- (3) 塗布にのみ使用し、内服しないでください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐ水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。



\* 2 4 0 6 D 0 9 \*

2024年6月改訂第9版