

こんな方におすすめ 肩こり・筋肉痛・腰痛でお困りの方



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと 天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないこと (1)目の周囲, 粘膜等. (2)湿疹, かぶれ, 傷口.



相談すること

1. 次の人は使用前に医師, 薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后, 次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので, 直ちに使用を中止し, この外箱を持って医師, 薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤, かゆみ, 痛み

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し, この外箱を持って医師, 薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能又は効果】

腰痛, 打撲, 捻挫, 肩こり, 関節痛, 筋肉痛, 筋肉疲労, しもやけ

【用法及び用量】

1日1~2回, ライナーをはがし, 患部に貼ってください。

【用法及び用量に関連する注意】

(1)用法及び用量を厳守してください。(2)小児に使用させる場合には, 保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。(4)汗をかいたり, 患部がぬれている時は, よく拭き取ってから使用してください。(5)皮膚の弱い人は, 使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に, 1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り, 発疹・発赤, かゆみ, かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。(6)皮膚の弱い人は, 同じ部位に続けて貼らないでください。

1枚サイズ(6.2cm×4.2cm)

製造販売元: 大協薬品工業株式会社
富山県富山市水橋畠等173

お客様相談窓口 ☎076-479-1313

受付時間 9:00~17:00

(土日祝日・年末年始・夏季など特別休業日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

【成分及び分量】 1.0㎡中

dl-カンフル1.80g
サリチル酸メチル9.00g
ハッカ油1.20g
L-メントール4.50g
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE) ...0.50g
ノニル酸ワニリルアミド0.01g

添加物として, ポリブテン, 生ゴム, ポリイソブチレン, エステルガム, テルペン樹脂, 沈降炭酸カルシウム, 酸化チタン, アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂, ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル, 天然ゴムラテックス, 香料, 赤色405号, 黄色205号を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)開封後は, 添付の保存袋に入れて保管してください。(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

※この商品は(株)マツキヨココカラ&カンパニーのオリジナル商品です。