



Pain Relief Plaster  
鎮痛消炎プラスター  
ゴールドパスE

痛みのもとに密着浸透

# 肩こり 筋肉痛・腰痛に



1枚サイズ(6.2cm×4.2cm)

保存袋付

薬のはたらき

肩こり

筋肉痛

腰痛

サリチル酸メチル:9.00g

・痛みを鎮めます

トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE):0.50g

・血行を促進します

ノニル酸ワニリルアミド:0.01g

・炎症を抑えます

dl-カンフル:1.80g

ハッカ油:1.20g

・清涼感を与えます

l-メントール:4.50g

第3類医薬品

1.0m<sup>2</sup>中

販売名:ゴールドパスE

外用鎮痛消炎薬

第3類医薬品

こんな方におすすめ 肩こり・筋肉痛・腰痛でお困りの方

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと 天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないこと (1) 目の周囲、粘膜等。 (2) 湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状          |
|------|--------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ、痛み |

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能又は効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ

【用法及び用量】

1日1～2回、ライナーをはがし、患部に貼ってください。

【用法及び用量に関連する注意】

(1) 用法及び用量を厳守してください。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。(4) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。(5) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。(6) 皮膚の弱い人は、同じ部位に続けて貼らないでください。

1枚サイズ(6.2cm×4.2cm)

製造販売元: 大協薬品工業株式会社

富山県富山市水橋畠等173

お客様相談窓口 ☎076-479-1313

受付時間 9:00～17:00

(土日祝日・年末年始・夏季など特別休業日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

【成分及び分量】 1.0m<sup>2</sup>中

dl-カンフル .....1.80g  
サリチル酸メチル .....9.00g  
ハッカ油 .....1.20g  
l-メントール .....4.50g  
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE) ...0.50g  
ノニル酸ワニリルアミド .....0.01g

添加物として、ポリブテン、生ゴム、ポリイソブチレン、エステルガム、テルペン樹脂、沈降炭酸カルシウム、酸化チタン、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、天然ゴムラテックス、香料、赤色405号、黄色205号を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4) 開封後は、添付の保存袋に入れて保管してください。(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

※この商品は(株)マツキョココカラ&カンパニーのオリジナル商品です。

セルフメディケーション

税 控除 対象