



Pain Relief Plaster
鎮痛消炎プラスター
ゴールドパス

痛みのもとに密着浸透

肩こり 筋肉痛・腰痛に

目立ちにくい
ベージュ色

1枚サイズ(7.0cm×5.0cm)

薬のはたらき

肩こり

筋肉痛

腰痛

サリチル酸メチル:10.0g

・痛みを鎮めます

トコフェロール酢酸エステル
(ビタミンE):2.0g

・血行を促進します

l-メントール:3.0g

・清涼感を与えます

第3類医薬品

膏体100g中

外用鎮痛消炎薬
販売名:ゴールドパス

第3類医薬品

こんな方におすすめ 肩こり・筋肉痛・腰痛でお困りの方

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないこと
(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能又は効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ

【用法及び用量】

1日数回、ライナーをはがし、患部に貼ってください。

【用法及び用量に関連する注意】

(1)用法及び用量を厳守してください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)患部の皮膚は清潔にして貼ってください。(4)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。(5)皮膚の弱い人は、同じ部位に続けて貼らないでください。

1枚サイズ(7.0cm×5.0cm)

製造販売元:大協薬品工業株式会社
富山県富山市水橋畠等173

お客様相談窓口 ☎076-479-1313

受付時間 9:00～17:00

(土日祝日・年末年始・夏季など特別休業日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

【成分及び分量】膏体100g中

サリチル酸メチル10.0g
l-メントール3.0g
トコフェロール酢酸エステル2.0g

添加物として、ジブチルヒドロキシトルエン、脂環族飽和炭化水素樹脂、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、タルク、ポリイソブチレン、流動パラフィンを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)開封後は袋の口を折り曲げて保管してください。(5)使用期限を過ぎた商品は使用しないでください。

※この商品は(株)マツキヨココカラ&カンパニーのオリジナル商品です。

セルフメディケーション

税 控除 対象