

matsu
kiyo

2つのかゆみ止め成分配合

ウレパス20DXローション

乾燥肌による かゆみに 効く!

うるおい
保湿成分
尿素20%

薬のはたらき

かゆみを止める

カサカサ肌を潤いお肌に

尿素：20g	・ 皮ふをしっとり軟らかくします
リドカイン：2g	・ かゆみの伝達をブロックして抑えます
ジフェンヒドラミン：1g	・ かゆみの元ヒスタミンを抑えます
グリチルレチン酸：0.3g	・ 皮ふの荒れを抑えます
トコフェロール酢酸エステル：0.5g	・ 皮ふの血行をよくします

100g中

乾燥性皮膚用薬

第2類医薬品

広い範囲の
乾燥肌に



硬くなった
ひじ・ひざ
かかと
くるぶしに



【成分】100g中

尿素……………20g
リドカイン……………2g
ジフェンヒドラミン……………1g
グリチルレチン酸……………0.3g
トコフェロール酢酸エステル…0.5g
添加物：DL-アラニン、グリシン、クエン酸Na水和物、乳酸、乳酸Na、エデト酸Na水和物、セタノール、ステアリン酸ポリオキシル、パラベン、ミリスチン酸イソプロピル、カルボキシビニルポリマー、*l*-メントール、香料

【保管および取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- (4) キャップの閉め方が不十分な場合、乳液が乾燥し、ザラザラ感がでることがありますので、ご使用のつどキャップをきちんと閉めてください
- (5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください

ここから
開けてください

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください

(1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人

2. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目のまわり、粘膜等
- (2) 引っかき傷等の傷口、亀裂(ひび割れ)部位
- (3) かさぶたのように皮ふがはがれている所
- (4) 炎症部位(ただれ・赤くはれている所)

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、ピリピリ感)、はれ、かさぶたのように皮ふがはがれる状態

3. 2週間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

【効 能】

かゆみを伴う乾燥性皮膚(老人・成人の乾皮症)

【用 法】

1日1～数回、適量を患部に塗布してください

- (1) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください
- (2) 小児(15歳未満)には使用させないでください
- (3) 外用にのみ使用してください

※この商品は(株)マツモトキヨシホールディングスのオリジナル商品です。

こんな方におすすめ

- ・かさつく肌をなめらかにしたい方
- ・乾燥によるかゆみを止めたい方に

5つの有効成分配合

かゆみ止め
成分

ジフェンヒドラミン

かゆみ止め
成分

リドカイン

消炎成分

グリチルレチン酸


血行促進
成分

トコフェロール
酢酸エステル


保湿成分

尿素20%

2種類のかゆみ止め成分が
乾燥肌によるかゆみを鎮めます



皮ふやわらか成分(尿素)などが
うるおいのあるお肌にします



発売元

東光クリエート株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

製造販売元

東光薬品工業株式会社
東京都足立区新田2丁目16番23号

◆お問い合わせ先◆

お客様相談窓口 03-3855-0101

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)