

瞳の健康を考えた1回使い切りタイプ ティアージェ シリーズ

ものもらい・結膜炎の治療に ティアージェ抗菌目薬

第2類医薬品

特長

有効成分が
目の表面に **長くとどまる**

ヒアルロン酸Na
(粘稠剤として)
配合

(はやり目)
結膜炎



ものもらい

(まぶたのただれ)
眼瞼炎



かゆみ

**抗菌成分
サルファ剤**

細菌に対して強い抗菌力を持つサルファ剤を
基準内最大濃度配合*

[スルファメトキサゾールナトリウム 4.0%]

**W配合
抗炎症成分**

グリチルリチン酸二カリウムとイプシロン-アミノ
ノカプロン酸が目の炎症を効果的にしずめます。

**防腐剤
フリー**

無菌充てん・防腐剤無添加の「1回使い切りタイプ」で、使うときいつでも新鮮・清潔です。小さなお子様にもご使用いただけます。

※眼科用薬製造(輸入)承認基準

保管・取扱注意

- 品質を保つため、保存する場合は内袋と箱に入れてください。
- 本品は、無色から微褐色の点眼薬です。使用時に微褐色に着色している場合がありますが、有効成分であるサルファ剤によるものですので、ご心配ありません。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 1 次の人は使用しないでください。
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2 長期連用しないでください。



相談すること

- 1 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(4) 次の症状のある人 ・はげしい目の痛み
- 2 次の場合は直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 使用後、次の症状が現れた場合

関係部位	症状
皮フ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

(2) 3～4日間使用しても症状がよくならない場合

【用法・用量】 1日5～6回、1回2～3滴点眼する。

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) キャップの部分を軽く引っ張りながら、ゆっくりまわして開封してください。
(勢いよく開封すると、薬液が飛び散る場合があります。)
- (5) 点眼用にのみ使用してください。



【効能・効果】 ものもらい、結膜炎（はやり目）、目のかゆみ、眼瞼炎（まぶたのただれ）

【成分・分量】 スルファメトキサゾールナトリウム4.0%、グリチルリチン酸二カリウム0.2%、イブシロン-アミノカプロン酸1.0%、添加物として、ホウ酸、ホウ砂、ヒプロメロース、ヒアルロン酸ナトリウム、pH調節剤を含有します。

【保管および取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。保管する際は箱に収納するなど光が当たらないようにしてください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用後に薬液が残っていても、再使用しないでください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、一度内袋を開封した後はすみやかに使用してください。
- (7) 本剤を携帯する際、ズボンの後ろのポケット等に入れないでください。(キャップ部分が折れて開いてしまうおそれがあります。)
- (8) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。

株式会社オフテクス

神戸市中央区港島南町5-2-4

オフテクスお客様相談室

☎0120-021094

受付:月～金(祝日は除く) 9:00～17:00