



Customer Satisfaction Comes First

明治薬品株式会社

腸内細菌のバランスを整える

ラクトロン錠

乳酸菌・消化酵素配合

消化不良による
腹部膨満感

整腸
(便通を整える)

食欲不振

もたれ
(胃もたれ)



整腸・消化薬

指定医薬部外品

◀ ここからお切りください。開封後はチャックをしっかりと閉めください。

使用前にこの袋の説明文書を必ずお読みください。

指定医薬部外品

販売名：ラクトロン錠 整腸・消化薬

使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

消化促進、消化不良、食欲不振(食欲減退)、食べ過ぎ(過食)、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、消化不良による胃部・腹部膨満感、整腸(便通を整える)、軟便、便秘

成分・分量

成人1日量(6錠)中
有孢子性乳酸菌.....120mg
脾臓性消化酵素TA.....90mg
バイオアスターゼ1000.....120mg
添加物として乳糖水和物、セルロース、カルメロースCa、ステアリン酸Mgを含有。

用法・用量

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2錠	1日3回、食後、水又は温湯 (ぬるま湯)で服用する。
8歳以上15歳未満	1錠	
5歳以上8歳未満	1/2錠	
5歳未満	服用しないでください。	

お問い合わせ先
お客様相談室
☎ 0120-53-3451
平日 9:00~17:00

〈用法及び用量に関連する注意〉

5歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4) 水分が錠剤に付きますと、内容成分の変化の原因となりますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないこと。(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。(6) 袋のチャックは湿気などを避けるために使用のつどしっかりと閉めること。(7) 袋内に乾燥剤が入っていますが、服用しないこと。

製造販売元：明治薬品株式会社
富山県富山市三郷6番地