

この説明文書はお薬とともに保管し、使用の際にはよく読むこと。

◎必ず、お子様の手の届かないところに、このお薬を保管すること。

Ⓐ

オゾこどもせきどめシロップF 第2類医薬品

せき／たん



使用上の注意

(本剤は小児用であるが、鎮咳去痰薬として定められた一般的な注意事項を記載している。)



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1 次の人は服用しないこと

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）

3 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと

(眠気等があらわれることがある。)

必ずお守り下さい



相談すること

1 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- ①医師の治療を受けている人。
- ②妊婦又は妊娠していると思われる人。
- ③薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- ④次の症状のある人。
高熱、排尿困難
- ⑤次の診断を受けた人。
緑内障

2 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
呼 吸 器	息苦しさ、息切れ
泌 尿 器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
シ ョ ッ ク (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無 顆 粒 球 症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

口のかわき、眠気

4 5～6回服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(裏面も読むこと。)

用法・用量

1日3回毎食後及び必要な場合には就寝前に服用する。
なお、場合により約4時間毎に1日6回まで服用することができる。

年 齢	1 回 量	服用回数
11歳以上15歳未満	10mL	1日3回
8歳以上11歳未満	7.5mL	
5歳以上8歳未満	5mL	
3歳以上5歳未満	3.5mL	
1歳以上3歳未満	3mL	
3カ月以上1歳未満	1.5mL	
3カ月未満	服用しない	


〈用法及び用量に関連する注意〉

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
 - 2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させること。
 - 過量服用等に注意し、用法・用量を厳守すること。
- ◎添付の目盛付きコップで量り、使用のつどよく洗い、本剤とともに清潔に保管すること。

お子さまの誤飲を防ぐ 安全キャップの使い方

●開け方

- ①テーブル等平らな所に置きキャップを下に強く押しながら
- ②矢印の方向に回してあける。



●閉め方

- びんの口の周囲をよくふいてから、キャップをしっかりとしめる。
※キャップを押さずに回すとカチカチと音がして空回りする。

効能・効果

せき、たん



本品の成分・分量と作用

成 分	分量(60mL)中	作 用
デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物	40mg	せきをしずめ、呼吸を楽にする。
グアイフェネシン	200mg	気道粘膜の分泌機能を亢進させ、たんをうすくし、出しやすくする。
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	4mg	アレルギー性のせきをしずめる。
キキョウ流エキス (原生薬換算量300mg)	0.3mL	せきをしずめ、たんを出しやすくする。

添加物として、白糖、果糖、D-ソルビトール液、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物、ブチルパラベン、安息香酸ナトリウム、エチルアルコール、プロピレングリコール、カラメル、バニリン、香料を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- 1 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
 - 2 小児の手の届かない所に保管すること。
 - 3 他の容器に入れ替えないこと
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
 - 4 服用のつどビンの口の周囲を清潔に拭いてからキャップをしめること。
 - 5 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
 - 6 一度フタをあけた後は、使用期限内でも、なるべく長期間の使用はしないこと。
- ※本剤は生薬成分を配合した内服液であり、まれに沈殿を生じることがあるが、よく振ってから服用すること。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

明治薬品株式会社 お客様相談室

電 話：0120-53-3451

受 付 時 間：9:00～17:00(土、日、祝日、特定休日を除く)

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

製造販売元



明治薬品株式会社

富 山 県 富 山 市 三 郷 6 番 地