

matsu
kiyo

Antipruritic and
Anti-Inflammatory Agent
鎮痒消炎薬
カユミーナローションⅦ

虫さされによる
かゆみを
すばやく鎮める

液体

7つの有効成分配合

薬のはたらき

かゆみ

はれ・赤み

デキサメタゾン酢酸
エステル：0.025g
グリチルレチン酸：
0.3g

・ 抗炎症成分

ジフェンヒドラミン
塩酸塩：1g
リドカイン：0.5g

・ かゆみ止め成分

イソプロピルメチル
フェノール：0.1g

・ 殺菌成分

l-メントール：3.5g
dl-カンフル：2g

・ 清涼感成分

第②類医薬品

100mL中

開封口

第②類医薬品

販売名：カユミーナローションⅦ

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください。
(1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部
(2) 目の周囲、粘膜など
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 患部が広範囲の人
- (5) 湿潤やただれのひどい人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

ご使用に際して、この箱の説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

効能・効果

虫さされ、かゆみ、湿疹、皮膚炎、かぶれ、じんましん、あせも、しもやけ

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 本剤にはアルコールが含有されているため、塗布した時にしみる場合があります。
- (5) 本剤のついた手で、目など粘膜にふれないでください。
- (6) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (7) 使用する際は、スポンジ部分をゆっくり患部に数回押し当て、スポンジに薬液を十分しみ込ませてから塗布してください。(スポンジ面に薬液が十分しみ込んでいない状態で使用すると、スポンジが破損する場合があります。)また、スポンジ面に薬液をしみ込ませても、強く押し当てたまま塗布しますと、スポンジが破損する原因になりますのでご注意ください。
※暑い時期など、内圧が高まり、薬液が多く出ることがありますので、ご使用前に、キャップを開けて容器を立てたまま、スポンジ部分を数回押ししてください。

成分・分量 (100mL中)

デキサメタゾン酢酸エステル …… 0.025g
ジフェンヒドラミン塩酸塩 …… 1g
グリチルレチン酸 …… 0.3g
イソプロピルメチルフェノール …… 0.1g
リドカイン …… 0.5g
dl-カンフル …… 2g
l-メントール …… 3.5g
添加物：1,3-ブチレングリコール、酒石酸、イソプロパノール、エタノール

保管及び取扱い上の注意

- (1) 使用後は、速やかにキャップを十分に閉めて、直射日光の当たらない涼しい所に立てて保管してください。(保管方法を守らないと、塗布部のスポンジ破損の原因になったり、液漏れにつながる恐れがあります。)
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 時計、めがね等の金属類、プラスチック類、化学繊維類、皮革製品、塗装のしたある床・家具などに付着すると変質することがありますので、付着しないよう注意してください。
- (6) 衣類に付着した場合は、なるべく早く水又は洗剤で洗ってください。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

火気厳禁

第二石油類 水溶性 危険等級Ⅲ

※この商品は(株)マツキヨココカラ&カンパニーのオリジナル商品です。

製造販売元

ジャパンメディック株式会社
富山県富山市横越168

お客様相談窓口

☎ 076-438-1107

受付時間：月～金9:00～17:00
(祝日・年末年始を除く)

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

セルフメディケーション

税 控除 対象