

〔使用上の注意〕 相談すること

次の場合は、直ちに服用を中止し、この瓶を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 服用後、皮ふに発疹があらわれた場合。
- (2) しばらく服用しても症状がよくなる場合。

〔効能・効果〕

●滋養強壮●虚弱体質●肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期等の場合の栄養補給

〔用法・用量〕

成人(15歳以上)1日1回1瓶(100mL)を服用してください。

15歳未満は服用しないでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) よく振ってから服用してください。(2) 定められた用法、用量を厳守してください(他のビタミン等を含む製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意してください)。

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1) 直射日光を避け、なるべく涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 誤用を避け、品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください。(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

発売元 **日野薬品工業株式会社**
滋賀県蒲生郡日野町上野田119

お問い合わせ先/お客様相談窓口

☎ 0748-52-1232 受付時間 9:00~17:00
(土、日、祝日を除く)

製造 **大同薬品工業株式会社**
販売元 奈良県葛城市新村214-1

※この商品は(株)マツキヨココカラ&
カンパニーのオリジナル商品です。

matsu
kiyo

2000

つらい疲れに

ビタミンB1

ビタミンB2

ビタミンB6

Vitamin-containing Health Drugs

タウリン2000mg+アミノ酸配合

ハイビタオール2000

指定医薬部外品

販売名:ツカレナミン2000

〔成分・分量〕

1日量(100mL)中

チアミン硝化物(ビタミンB1
硝酸塩) 10mg、リボフラビ
ンリン酸エステルナトリウム
(ビタミンB2リン酸エステ
ル) 5mg(リボフラビンとして
3.9mg)、ピリドキシン塩酸
塩(ビタミンB6) 6mg、ニコ
チン酸アミド20mg、無水カ
フェイン50mg、タウリン20
00mg、L-アルギニン塩酸塩
100mg

添加物として、果糖ブドウ糖
液糖、クエン酸水和物、安息
香酸ナトリウム、香料、エタ
ノール、エチルバニリン、バ
ニリン、プロピレングリコー
ルを含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の服用により、尿が黄色くなること
がありますが、これは本剤に含まれるビ
タミンB2によるものです。