

販売名:ハイビタオール4000

服用に際しては、瓶の表示を必ず読むこと

【使用上の注意】 相談すること

次の場合は、直ちに服用を中止し、この瓶を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1)服用後、次の症状があらわれた場合。皮ふ:発疹、消化器:胃部不快感(2)しばらく服用しても症状がよくなる場合。

【効能・効果】

●滋養強壮●虚弱体質●肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1瓶(100mL)を服用してください。

15歳未満は服用しないでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)よく振ってから服用してください。(2)用法、用量を厳守してください(他のビタミン等を含む製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意してください)。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光を避け、なるべく涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)誤用を避け、品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

発売元 日野薬品工業株式会社
滋賀県蒲生郡日野町上野田119

お問い合わせ先/お客様相談窓口
☎ 0748-52-1232 受付時間 9時~17時
(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931

製造販売元 大同薬品工業株式会社
奈良県葛城市新村214-1

※この商品は(株)マツキヨココカラ&
カンパニーのオリジナル商品です。

matsu
kiyo

4000

つらい疲れに

Vitamin-containing
Health Drugs

タウリン3000mg
+ アミノ酸類*1000mg配合

ビタミンB2・ビタミンB6・イカリソウ
(インヨウカク)

ハイビタオール4000

第2類医薬品

【成分・分量】1日量(100mL)中
リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2リン酸エステル)5mg(リボフラビンとして3.9mg)、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)20mg、ニコチン酸アミド20mg、無水カフェイン50mg、タウリン3000mg、L-アルギニン塩酸塩180mg、アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物200mg、L-バリン80mg、L-ロイシン160mg、L-イソロイシン80mg、グリシン300mg、インヨウカク流エキス100 μ L(アルコール0.11mL以下)
添加物:果糖ブドウ糖液糖、スクラロース、アセスルファムカリウム、クエン酸水和物、安息香酸ナトリウム、パラベン、エタノール、香料、プロピレングリコール、バニリン、エチルバニリン、D-ソルビトール

〈成分・分量に関連する注意〉

(1)本剤の服用により、尿が黄色くなることがありますが、これは本剤に含まれるビタミンB2によるものです。(2)本品は、生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じることがありますが、服用に支障はありません。よく振ってから服用してください。

[アミノ酸類*]L-アルギニン塩酸塩、アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物、L-バリン、L-ロイシン、L-イソロイシン、グリシン