

手ピカ[®]
ジェル

プラス

広範囲の

ウイルス

細菌に効く



手指消毒用

アルコールジェル

指定医薬部外品

販売名：手指消毒用ジェルV3

使用に際しては、説明書をよく読んで

ください

〔成分〕エタノール(C₂H₆O) 76.9～81.4 vol%

添加物：リン酸、グリセリン、アラントイン、ミリスチン

酸イソプロピル、グリセリン脂肪酸エステル、パラオキシ安息香酸エチル、N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-アルギニンエチル・DL-ピロリドンカルボン酸塩、ヒドロキシプロピルセルロース

注意 1. 次の人は使用しないでください●患部が広範囲の人●深い傷やひどいやけどの人 2. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください●医師の治療を受けている人●本人又は家族がアレルギー体質の人●薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 3. 外用にのみ使用してください 4. 使用後は手を十分に乾燥させてください(乾燥不十分のまま火気に手を近づけると引火するおそれがあります) 5. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください 6. 小児の手の届かない所に保管してください 7. 火気に近づけないでください 8. 薬剤が床、家具、革製品、大理石や一部の宝石等に付着しないようにしてください(変質又は変色のおそれがあります)

®登録商標

健栄製薬株式会社

大阪府中央区伏見町2丁目5番8号

電話番号 06(6231)5626

火気厳禁 (エタノール含有)

右下部からはがして、説明書をよく読んでください。

指定医薬部外品

速乾性すり込み式

チピカ[®] ジェルプラス

アルコール類＊水溶性＊危険等級Ⅱ

火気厳禁



使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は使用しないでください

- (1) 患部が広範囲の人。
- (2) 深い傷やひどいやけどの人。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください
使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

【効能効果】手指・皮膚

の洗浄・消毒

【用法用量】適量を手指にとり、塗布又は塗擦してください。

〈用法用量に関連する注意〉 (1)用法用量を厳守してください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4)外用にのみ使用してください。(5)血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、使用してください。(6)使用後は手を十分に乾燥させてください。(乾燥不十分のまま火気に手を近づけると引火するおそれがあります。)

【成分分量】

エタノール (C₂H₆O) 76.9 ~ 81.4 vol%を含有します。

添加物：リン酸、グリセリン、アラントイン、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン脂肪酸エステル、パラオキシ安息香酸エチル、N-ヤシ油脂肪酸アシルレールアルギニンエチル・DL-ピロリドンカルボン酸塩、ヒドロキシプロピルセルロース

【保管及び取扱い上の注意】 (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4)火気に近づけないでください。(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。(6)薬剤が床、家具、革製品、大理石や一部の宝石等に付着しないようにしてください。(変質又は変色のおそれがあります。)

〈貯法〉 気密容器。火気を避けて室温保存。



ケンエー

健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号

電話番号 06(6231)5626