

あけくち

日本薬局方

センブリ

販売名 山本漢方せんぶり

【特徴】

本品は生薬の煎じ薬(ティーバッグタイプ)です。

△ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヵ月位(食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつきに服用する場合は5～6回)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

お客様相談窓口

山本漢方製薬株式会社

〒485-0035 愛知県小牧市多気東町156番地

電 話 0568-73-3131

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日は除く)

<http://www.kanpo-yamamoto.com>

副作用被害救済制度 ☎ 0120(149)931

製造販売元

山本漢方製薬株式会社

愛知県小牧市多気東町156番地

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

効能又は効果

胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき

用法及び用量

年 齢	1回量	服用回数
大人 (15歳以上)	0.8gの煎液 の1/3	1日3回を限度とする。

大人(15歳以上)は、1日量0.8g(1包)を水約300mLをもって煮て、約150mLに煮つめ、カスを取り去り、食前又は食間に1日3回服用する。
あるいは熱湯中に浸して振りだし、その振出液を服用する。

〈注意〉

定められた用法及び用量を厳守してください。

成分及び分量 1日量 1包(0.8g)中

成 分	分 量	作 用
日本薬局方 センブリ	0.8g	センブリ中の苦味配糖体が食欲の増進をうながす。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【その他】

○センブリの煎じ方(大人15才以上)
土ビンかヤカン(アルミ製、ステンレス製)にて水約300mLの中へ、本品1包を入れ、中の煎剤が軽く泡立つ程度の弱火にて、約150mLになるまで(約10～15分)煎じて、火を止め、袋を取りだしてください。または湯呑み茶碗などの中へ本品1包を入れ、上から熱湯を注ぎ、よく振りだして、その振出液をお飲みください。

○本品を煎じた後の保管
夏期は、長時間煎液を放置しますと、腐敗する恐れもありますので、煎液は冷蔵庫に保管してください。