

医薬品

のんで

口臭を除去

二日酔いにも

葉緑素成分が臭いの
原因物質に作用します

サクロフィール錠[®]



お酒を飲んだ
翌朝に



ニオイの強い
食事後に



デートの前に

第3類医薬品



サクロフィール錠は、葉緑素から作られた緑の成分が、体の中で臭いの原因物質に作用し、口臭を取り除きます。

開封口

医薬品

ご使用に際して、この箱の説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

サクロフィール[®]錠



使用上の注意



相談すること

① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。医師の治療を受けている人 ② 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。軟便 **その他の注意** 口臭の原因となる病気がある場合には、これらの治療にも心がけてください。

効能・効果 口臭の除去、二日酔い

用法・用量 成人(15歳以上)は1回3～4錠、1日1～3回水またはお湯で服用してください。小児(15歳未満)は服用しないでください。

1錠中の成分 銅クロロフィリンナトリウム……………15mg
(体の中で臭いの原因物質に作用し、口臭を取り除きます。)

添加物として、トウモロコシデンプン、dl-メントール、ケイ酸Mg、ステアリン酸Ca、白糖を含有

●服用後、舌の表面に緑色がつきますが、これは銅クロロフィリンナトリウムによる着色です。時間の経過とともに消失します。●服用後、便が緑色を呈したり、便臭がうすくなることがあります。銅クロロフィリンナトリウムによる着色と脱臭作用ですから心配ありません。

錠剤の取り出し方 右図のように、錠剤の入っているシートの凸部を指先で強く押し出して、裏面のアルミ箔を破り、錠剤を取り出して服用してください。(誤ってシートのままのみこんだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。)



保管及び取扱い上の注意 ●直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。●小児の手の届かない所に保管してください。●他の容器に入れ替えないでください。また、本容器内に他の薬剤等を入れないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

製造販売元 アルフレッサファーマ株式会社
大阪府中央区石町二丁目2番9号

発売元 エーザイ株式会社
東京都文京区小石川4-6-10

本品に関するお問い合わせは、
エーザイ「hhcホットライン」へ

0120-161-454

eisai.jp

ひとくちメモ

Q: 口臭の除去を目的とする場合には、サクロフィール錠は、いつどのようにのめばよいのでしょうか?

A: 体の中で、臭いのもとに直接働きますので、口臭が気になるときに、用法・用量の範囲で、いつでもおのみください。かんだり、なめたりする必要はありません。

Q: なぜ緑色をしているのですか?

A: サクロフィール錠は葉緑素から作られた緑の成分を配合しています。濃い緑色をしているのはこのためです。

葉緑素
成分配合

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)