

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品 芳香性健胃消化薬 **太田胃散**

⚠ 使用上の注意

- ⊗ してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 1. 透析療法を受けている人は服用しないでください 2. 長期連用しないでください
- 👤 相談すること** 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3) 腎臓病、甲状腺機能障害の診断を受けた人。2. 服用後、皮膚に発疹・発赤、かゆみの症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 3. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

■**効能・効果** 飲みすぎ、胸やけ、胃部不快

感、胃弱、胃もたれ、食べすぎ、胃痛、消化不良、消化促進、食欲不振、胃酸過多、胃部・腹部膨満感、はきけ(胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心)、嘔吐、胸つかえ、げっぷ、胃重

■**用法・用量** 成人(15歳以上)1回1.3g、8~14歳 1回0.65g、1日3回食後

又は食間に服用してください。8歳未満は服用しないでください。(添付のさじはすり切り1杯で約1.3gです。中ぶた裏のすり切り板をご使用ください。食間とは食後2~3時間のことをいいます。)<用法・用量に関連する注意>水又はぬるま湯

で服用してください。小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。■**成分**(1.3g中)ケイヒ92mg、ウイキョウ24mg、ニクズク20mg、

チョウジ12mg、チンピ^o22mg、ゲンチアナ15mg、ニガキ末15mg、炭酸水素ナトリウム625mg、沈降炭酸カルシウム133mg、炭酸マグネシウム26mg、合成ケイ酸

アルミニウム273.4mg、ビオチンアスターゼ40mg [添加物]l-メントール ■**保**

管及び取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。

<製品のお問い合わせ先>お客様相談室 ☎(03)3944-1311

受付時間9:30~17:00(土、日、祝日等を除く)

製造販売元 株式会社 太田胃散
東京都文京区千石 2-3-2