

なめらかな肌へ 皮膚軟化治療薬 (販売名) 近江兄弟社メンタームクリームU20

乾燥肌の手荒れ、カチカチになったかかと、黒ずんでザラザラのひじ・ひざ・くるぶしは、角質層の水分が不足しています。

近江兄弟社メンタームクリームU20は、尿素を20%配合し体内にある水分を取り込んで角質層の水分を保持します。またビタミンE(トコフェロール酢酸エステル)とグリチルリチン酸二カリウムが血行をよくして肌荒れを防止します。

3つの有効成分の働き

尿素 (20%配合)

保湿効果：角質層に水分を引きよせ、お肌のうるおいを保ちます。


ビタミンE

血行促進効果：お肌の血行を促進し、新陳代謝を高めます。

グリチルリチン酸二カリウム

炎症抑制効果：肌荒れを改善します。

尿素の作用



■こんな症状に



水仕事などで
ガサガサの手指



硬くぶ厚くなった
カチカチかかと



乾皮症で
カサカサの肌



黒ずんで**ザラザラ**の
ひじ・ひざ・くるぶし

⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと**〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります〕
次の部位には使用しないでください。

- (1)目の周囲、粘膜等 (2)引っかき傷等の傷口、亀裂(ひび割れ)部位
(3)かさぶたの様に皮膚がはがれているところ (4)炎症部位(ただれ・赤くはれているところ)



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人
(2)薬などによりアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)又は刺激症状を起こしたことがある人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、かぶれ、刺激感(痛み、熱感、ぴりぴり感)、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態

- 2週間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果 手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

次の注意事項を守ってください

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないよう注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (4)本剤は外用にのみ使用してください。
- (5)化粧品ではないので、効能・効果で定められた患部のみに使用し、基礎化粧等の目的で顔面には使用しないでください。

成分・分量〔100g中に次の成分を含みます。〕

成 分	分 量	働 き
尿素	20.0 g	角質軟化作用(硬くなった皮膚をやわらかくする働き)と保湿作用(皮膚をみずみずしく保つ働き)があります。
グリチルリチン酸二カリウム	0.5 g	皮膚の荒れをしずめます。
トコフェロール酢酸エステル	0.5 g	血行を促進して、新陳代謝を高めます。

添加物として、セトステアリルアルコール、白色ワセリン、スクワラン、軽質流動パラフィン、ミリスチン酸イソプロピル、ポリソルベート60、自己乳化型モノステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ジメチルポリシロキサン、プロピレングリコール、グリセリン、キサンタンガム、2,2',2''-ニトリロトリエタノール、メチルパラベン、プロピルパラベン、その他2成分を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1)本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。
- (2)極端な低温・高温・直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3)小児の手の届かない所に保管してください。
- (4)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

お問い合わせ 株式会社 近江兄弟社 お客様相談室 TEL.0748-32-3135
※ 受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 株式会社 近江兄弟社 滋賀県近江八幡市魚屋町元29

副作用被害救済制度のお問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/>
(フリーダイヤル) 0120-149-931