

指定医薬部外品

口唇炎・口角炎



使いやすい
リップスティック
タイプ

唇の皮むけ ひび割れに 塗りごこちやわらか

4つの
有効成分配合

新陳代謝促進成分

ビタミン
E

乾燥防止成分

ビタミン
B₆



Menturm
Medical
Lip Stick
Clear

無香料

OMI■

唇の皮むけ、ひび割れ、口角の切れ、ただれ

Menturm Medical Lip Stick

無香料(ノンメントール)

4つの有効成分がひどい唇荒れをケア

アラントイン▶組織修復促進成分 ビタミンE▶新陳代謝促進成分
ビタミンB₆▶唇あれ防止成分 グリチルレチン酸▶炎症抑制成分

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3) 湿潤やただれのひどい人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。使用後、皮膚に、発疹・発赤、かゆみがあらわれた場合。
- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔販売名〕近江兄弟社リップスティックC

効能・効果

口唇のひびわれ、口唇のただれ、口唇炎、口角炎

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関する注意〉(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2) 口唇への外用にのみ使用してください。(3) 2～3ミリ出してご使用ください。長く出しすぎると折れることがあります。(4) 使用後は、リップクリームを繰り下げてからキャップをしてください。(5) 食事の後などは口の周りをふいてからご使用ください。

成分・分量(本品100g中)

成分	分量
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	0.1g
アラントイン	0.5g
グリチルレチン酸	0.3g
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)	0.2g

添加物として、パラフィン、セレシン、サラシミツロウ、マイクロクリスタリンワックス、白色ワセリン、ハードファット、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ミリスチン酸オクチルドデシル、流動パラフィン、ジメチルポリシロキサン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、モノステアリン酸ソルビタン、ジブチルヒドロキシトルエン、メチルパラベン、プロピルパラベン、1,3-ブチレングリコール、精製水。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。

指定医薬部外品

製造販売元 株式会社近江兄弟社

滋賀県近江八幡市魚屋町元29

お客様相談室 TEL.0748-32-3135

受付時間 午前8:30～午後5:30

(土・日・祝日を除く)