

指定医薬部外品

口唇炎
口角炎



塗りごこち
やわらか

使いやすい
リップスティックタイプ



唇の皮むけ
ひび割れに

ビタミン

E

新陳代謝
促進成分

+

ビタミン

B₆

唇あれ
防止成分

4つの有効成分配合



Medical
Lip Stick

Menthol

メディカルリップスティック
メントール

〔販売名〕近江兄弟社リップスティックMa

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この台紙を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。使用後、皮膚に、発疹・発赤、かゆみがあらわれた場合。
3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この台紙を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

口唇のひびわれ、口唇のただれ、口唇炎、口角炎

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関する注意〉

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2) 口唇への外用にのみ使用してください。(3) 2～3ミリ出してご使用ください。長く出しすぎると折れることがあります。(4) 使用後は、リップクリームを繰り下げてからキャップをしてください。(5) 食事の後などは口の周りをふいてからご使用ください。

〈保管及び取扱い上の注意〉

(1) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

〈成分・分量〉(本品100g中)

ピリドキシン塩酸塩…0.1g

アラントイン…0.5g

グリチルレチン酸…0.3g

トコフェロール酢酸エステル…0.2g

添加物として、パラフィン、サラシミツロウ、マイクロクリスタリンワックス、ポリエチレン末、白色ワセリン、ハードファット、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ミリスチン酸オクチルドデシル、流動パラフィン、スクワラン、オリーブ油、ジメチルポリシロキサン、ポリソルベート60、モノステアリン酸グリセリン、ジブチルヒドロキシルエン、メチルパラベン、エチルパラベン、グリセリン、キシリトール、l-メントール、1,3-ブチレングリコール、精製水

指定医薬部外品

MADE IN JAPAN

製造販売元 株式会社近江兄弟社
滋賀県近江八幡市魚屋町元29
お客様相談室TEL.0748-32-3135
受付時間 9:00～17:00
(土・日・祝日を除く)