

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

総合かぜ薬

生薬配合

カイゲン顆粒

第②類医薬品

特 徴

カイゲン顆粒は、発熱や悪寒、頭痛、鼻水、せきなど、かぜの諸症状の緩和に効果をあらわす非ピリン系で、生薬を配合した顆粒状のかぜ薬です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 1. 次の人は服用しないでください
  - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください  
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等  
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
- 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(眠気等があらわれることがあります。)
- 4. 服用前後は飲酒しないでください
- 5. 長期連用しないでください

👤 相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 授乳中の人。
  - (4) 高齢者。
  - (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (6) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難
  - (7) 次の診断を受けた人。  
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位  | 症 状         |
|-------|-------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ   |
| 消化器   | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい         |
| 泌尿器   | 排尿困難        |
| その他   | 過度の体温低下     |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称                                                        | 症 状                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ショック<br>(アナフィラキシー)                                           | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。                                |
| 皮膚粘膜眼症候群<br>(スティーブス・ジョンソン症候群)、<br>中毒性表皮壊死融解症、<br>急性汎発性発疹性膿疱症 | 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。 |
| 肝機能障害                                                        | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。                                          |
| * 腎障害                                                        | 発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。                                            |
| 間質性肺炎                                                        | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。                         |
| ぜんそく                                                         | 息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。                                                          |
| 再生不良性貧血                                                      | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。                          |
| 無顆粒球症                                                        | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。                                                                    |

(裏面に続く)

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
    口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

かぜの諸症状（発熱、鼻水、鼻づまり、のどの痛み、頭痛、せき、たん、くしゃみ、悪寒、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和



用法・用量

次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に服用してください。

| 年 齢 | 15才以上 | 11才以上<br>～15才未満 | 8才以上<br>～11才未満 | 5才以上<br>～8才未満 | 3才以上<br>～5才未満 | 3才未満        |
|-----|-------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 1回量 | 1包    | 2/3包            | 1/2包           | 1/3包          | 1/4包          | 服用させないでください |

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

3包(6g)中に次の成分を含んでいます。

| 成 分                                                     | 含 量     | 作 用                                    |
|---------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|
| アセトアミノフェン                                               | 900mg   | 熱を下げ、頭痛、関節の痛みなどをやわらげます。                |
| ノスカピン                                                   | 30mg    | せきの中枢に働いてせきをしずめます。                     |
| dℓ-メチルエフェドリン塩酸塩                                         | 30mg    | 気管支をひろげ、せきをしずめます。                      |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩                                         | 7.5mg   | かぜの初期にみられる鼻水、鼻づまり、くしゃみのアレルギー症状をやわらげます。 |
| 無水カフェイン                                                 | 75mg    | 頭痛をやわらげます。                             |
| カンゾウ末                                                   | 750mg   | せきをしずめ、たんを出しやすくし、かぜの回復を助けます。           |
| キキョウ末                                                   | 1,000mg | たんをうすめ、出しやすくし、かぜの回復を助けます。              |
| ケイヒ末                                                    | 500mg   | 頭痛をやわらげ、熱を下げ、かぜの回復を助けます。               |
| ○添加物として白糖、ℓ-メントール、チョウジ油、ポビドン、アラビアゴム、メタケイ酸アルミン酸Mgを含有します。 |         |                                        |

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 1包を分割し服用した残りを使用する場合には、袋の口を折返して保管し、2日以内に服用してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (5) 外箱に表示の使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、または下記にお願い申し上げます。  
    カイゲンファーマ株式会社 お客様相談室 電話 06-6202-8911  
    受付時間：9：00～17：00（土曜、日曜、祝日を除く）