

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

「クラシエ」漢方葛根湯加川芎辛夷エキス錠

(カッコントウカセンキュウシンイ)

特 徴

- 「葛根湯加川芎辛夷」は「葛根湯」に川芎と辛夷を加えたもので、我が国の経験方として特に鼻炎、鼻づまり、蓄膿症に用いられる薬方です。
- アレルギー、寒冷等によるアレルギーやウイルス感染により鼻粘膜がうっ血し、鼻づまりなどの症状をひきおこします。このような症状や、長引いて慢性化した鼻炎、蓄膿症に効果があります。

⚠使用上の注意



相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- (1)医師の治療を受けている人
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3)体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
 - (4)胃腸の弱い人
 - (5)発汗傾向の著しい人
 - (6)高齢者
 - (7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - (8)次の症状のある人
むくみ、排尿困難
 - (9)次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感 やこわばりに加えて、脱力感、筋肉 痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 3.1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 4.長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能

比較的体力があるものの次の諸症：鼻づまり、蓄膿症（副鼻腔炎）、慢性鼻炎

用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	4錠	3回
15才未満7才以上	3錠	
7才未満5才以上	2錠	
5才未満	服用しないこと	

＜用法・用量に関連する注意＞

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成 分

成人1日の服用量12錠(1錠310mg)中、次の成分を含んでいます。
葛根湯加川芎辛夷エキス（1／2量）……………2,350mg
〔カッコン・マオウ各2.0g、タイソウ・センキュウ・シンイ各1.5g、
ケイヒ・シャクヤク・カンゾウ各1.0g、ショウキョウ0.5gより〕
抽出。

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスポビドン、
クロスCMC-Na、ステアリン酸Mg、二酸化ケイ素、セルロースを
含有する。

＜成分に関連する注意＞

本剤は天然物（生薬）のエキスをを用いていますので、錠剤の色が多少
異なることがあります。

また本剤は、生薬精油成分(においのする成分)を含んだエキスを使用
しておりますので、漢方薬特有のにおいがします。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して
ください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4)ビンの中の詰物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのもの
です。開栓後は不要となりますのですててください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6)水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがあり
ますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでくだ
さい。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<https://www.pmda.go.jp/>
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店
又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
クラシエ 薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334
受付時間 10：00～17：00（土、日、祝日を除く）

ホームページ www.kracie.co.jp

発 売 元 **クラシエ 薬品株式会社**
東京都港区海岸3-20-20（〒108-8080）

製造販売元 **クラシエ株式会社**
東京都港区海岸3-20-20（〒108-8080）