

✂ 切り取り線

Kracie

漢方セラピー 肌あれの方、イボのある方に



ヨクイニン

T-8

〈効能〉

いぼ、皮膚のあれ

〈用法・用量〉

1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	5錠	3回
15才未満	服用しないこと	

〈成分〉

成人1日の服用量15錠(1錠340mg)中

ヨクイニン末…4,200mg

添加物として、二酸化ケイ素、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mgを含有する。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物(ヨクイニン)を用いていますので、錠剤の色が多少異なることや、錠剤の表面に黒褐色の斑点が見られることがあります。また、ヨクイニン特有のにおいを感じる場合があります。

〈保管及び取扱い上の注意〉

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、チャックをしっかりとめて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。

発売元

クラシエ 薬品株式会社

東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)

ホームページ www.kracie.co.jp

製造販売元

クラシエ株式会社

東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)

お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334

受付時間 10:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先 ☎0120-149-931

✂ 切り取り線

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりとしめること

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第3類医薬品

チャック

生薬製剤

「クラシエ」ヨクイニン錠

△ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください