

Kracie

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

# 葛根湯エキス錠クラシエ

(カクコントウ)

## 特 徴

- 「葛根湯」は、漢方の古典といわれる中国の医書「傷寒論」<sup>ショウカンロン</sup>「金匱要略」<sup>キンキョウリャク</sup>に収載されている薬方です。かぜや肩こりなどに効果があります。
- かぜのひきはじめて、発熱して体がゾクゾクし、寒気がとれないような症状に効果があります。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1)医師の治療を受けている人
  - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3)体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
  - (4)胃腸の弱い人
  - (5)発汗傾向の著しい人
  - (6)高齢者
  - (7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
  - (8)次の症状のある人  
むくみ、排尿困難
  - (9)次の診断を受けた人  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がある  
ので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師  
又は登録販売者に相談してください

| 関係部位  | 症 状            |
|-------|----------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ      |
| 消 化 器 | 吐き気、食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称               | 症 状                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 偽アルドステロン症、<br>ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感や<br>こわばりに加えて、脱力感、筋肉痛が<br>あらわれ、徐々に強くなる。            |
| 肝機能障害               | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白<br>目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだ<br>るさ、食欲不振等があらわれる。          |
| * 多形紅斑              | 皮膚が広い範囲で赤くなる、水疱が<br>皮膚の赤い部分にあらわれる、高熱、<br>のどの痛み等が持続したり、急激に<br>悪化する。 |

- 3.1ヵ月位（感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5  
～6回）服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、  
この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してく  
ださい
- 4.長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談  
してください

効 能

体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

| 年 齢       | 1 回 量   | 1 日服用回数 |
|-----------|---------|---------|
| 成人（15才以上） | 4錠      | 3回      |
| 15才未満7才以上 | 3錠      |         |
| 7才未満5才以上  | 2錠      |         |
| 5才未満      | 服用しないこと |         |

＜用法・用量に関連する注意＞

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成 分

成人1日の服用量12錠(1錠400mg)中、次の成分を含んでいます。  
葛根湯エキス(1／2量) .....2,600mg  
〔カッコン4g、マオウ・タイソウ各2g、ケイヒ・シャクヤク〕  
〔各1.5g、カンゾウ1g、ショウキョウ0.5gより抽出。〕  
添加物として、セルロース、CMC－Ca、ケイ酸Al、クロスCMC－Na、ステアリン酸Mg、二酸化ケイ素を含有する。

＜成分に関連する注意＞

本剤は天然物(生薬)のエキスをを用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)ビンの中の詰物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開栓後は不要となりますのですててください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6)水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<https://www.pmda.go.jp/>  
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。  
**クラシエ 薬品株式会社** お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334  
受付時間 10：00～17：00（土、日、祝日を除く）

ホームページ [www.kracie.co.jp](http://www.kracie.co.jp)

発 売 元 **クラシエ 薬品株式会社**  
東京都港区海岸3-20-20（〒108-8080）

製造販売元 **クラシエ株式会社**  
東京都港区海岸3-20-20（〒108-8080）