

原寸大



Kracie

コッコアポ[®]G錠

太り方に合わせて選べる

二の腕・脇腹
タイプの
脂肪と便秘に

脂質代謝を上げて
脂肪を減らす

漢方
製剤

大柴胡湯

だいさいこうとう

第2類医薬品 肥満症・神経症・常習便秘

体力が充実して、脇腹からみぞおちあたりにかけて苦しく、便秘の傾向がある方に



●ストレスホルモンの増加を抑制し、脂質代謝を上げて余分な脂肪を減らします。●自律神経を整えながら、排便を促します。

切り取り線

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりしめること

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

販売名: コッコアポG錠

漢方製剤 第2類医薬品

チャック

使用上の注意

- ❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください 他の瀉下薬(下剤)
 2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

👤 **相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人 (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしただけで息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 下痢
4. 1ヵ月位(常習便秘、高血圧や肥満に伴う便秘に服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

[効能] 体力が充実して、脇腹からみぞおちあたりにかけて苦しく、便秘の傾向があるものの次の諸症: 胃炎、常習便秘、高血圧や肥満に伴う肩こり・頭痛・便秘、神経症、肥満症

[用法・用量] 次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

成人(15才以上) 1回4錠、15才未満7才以上 1回3錠、7才未満5才以上 1回2錠、5才未満は服用しないこと

<用法・用量に関連する注意> 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

[成分] 成人1日の服用量12錠(1錠340mg)中

大柴胡湯エキス(1/2量) 2,700mg
[サイコ3.0g、ハンゲ2.0g、ショウキョウ・ダイオウ各0.5g、オウゴン・シャクヤク・タイソウ各1.5g、キジツ1.0gより抽出。]

添加物として、二酸化ケイ素、クロスCMC-Na、クロスポリビドン、ステアリン酸Mgを含有する。

<成分に関連する注意> 本剤は天然物(生薬)のエキスをういていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

[保管及び取扱い上の注意] (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、チャックをしっかりしめて保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。(5) 水分が錠剤につきまると、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。

発売元 クラシエ 薬品株式会社

東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)
ホームページ www.kracie.co.jp

お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334
受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 クラシエ株式会社
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

副作用被害救済制度の問合せ先 ☎0120-149-931

®登録商標 10034 H01-S 1