

Kracie

コッコアポ<sup>®</sup>G錠

太り方に合わせて選べる

# 二の腕・脇腹 タイプの 脂肪と便秘に

脂質代謝を上げて  
脂肪を減らす

大柴胡湯

だいさいことう

肥満症・神経症・常習便秘

第2類医薬品

体力が充実して、脇腹からみぞおちあたりに  
かけて苦しく、便秘の傾向がある方に

漢方  
製剤

## 二の腕・脇腹タイプ

年を重ねることやストレスな  
どでホルモンバランスが乱  
れると脂質代謝が低下し、  
**上半身**を中心に、筋肉の  
少ない**二の腕・脇腹**に  
**脂肪**がたまりやすくなります。

また、このタイプは食生活が乱れ  
やすく、**便秘**にもなりがちです。

コッコアポG錠

大柴胡湯(だいさいことう)の働き

- ストレスホルモンの増加を抑制し、脂質代謝を上げて余分な脂肪を減らします。
- 自律神経を整えながら、排便を促します。



(原寸大)

第2類医薬品

ご使用に際して、  
外箱の説明文を  
必ずお読みくだ  
さい。また、必要  
な時に読めるよ  
うに大切に保管  
してください。

第2類  
医薬品

押して開ける

販売名：コッコアポG錠

[効能] 体力が充実して、脇腹からみぞおちあたりにかけて  
苦しく、便秘の傾向があるものの次の諸症：胃炎、常習便  
秘、高血圧や肥満に伴う肩こり・頭痛・便秘、神経症、肥満症

[用法・用量] 次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて  
服用。成人(15才以上) 1回4錠、15才未満7才以上 1回3錠、  
7才未満5才以上 1回2錠、5才未満は服用しないこと

<用法・用量に関連する注意> 小児に服用させる場合に  
は、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

[成分] 成人1日の服用量12錠(1錠340mg) 中  
大柴胡湯エキス(1/2量)..... 2,700mg  
〔サイコ3.0g、ハンゲ2.0g、ショウキョウ・ダイオウ各0.5g、  
オウゴン・シャクヤク・タイソウ各1.5g、キジツ1.0gより抽出。〕  
添加物として、二酸化ケイ素、クロスCMC-Na、クロスポビ  
ドン、ステアリン酸Mgを含有する。

<成分に関連する注意> 本剤は天然物(生薬)のエキスを  
用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

[保管及び取扱い上の注意]

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓し  
て保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管し  
てください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤  
用の原因になったり品質が変わります。)(4) ビンの中の詰  
物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。  
開栓後は不要となりますので捨ててください。(5) 使用期  
限を過ぎた製品は服用しないでください。(6) 水分が錠剤に  
つきますと、変色または色むらを生じることがありますので、  
誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。

発売元  
クラシエ 薬品株式会社  
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)  
ホームページ www.kracie.co.jp

製造販売元  
クラシエ株式会社  
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334  
受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度  
の問合せ先  
☎0120-149-931

⚠ 使用上の注意

- ❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が  
悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しない  
でください 他の瀉下薬(下剤)
  2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する  
場合は授乳を避けてください



**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に  
相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人  
(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)  
(4) 胃腸が弱く下痢しやすい人  
(5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こ  
したことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能  
性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って  
医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状            |
|------|----------------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ      |
| 消化器  | はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は  
直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると<br>息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱<br>等がみられ、これらが急にあらわれたり、<br>持続したりする。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が<br>黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲<br>不振等があらわれる。                      |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、この  
ような症状の持続又は増強が見られた場合には、  
服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は  
登録販売者に相談してください 下痢
4. 1ヵ月位(常習便秘、高血圧や肥満に伴う便秘に服用  
する場合には5~6日間)服用しても症状がよくな  
らない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、  
薬剤師又は登録販売者に相談してください