

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

防風通聖散エキスZ錠クラシエ

(ボウフウツウショウサン)

特 徴

- 「防風通聖散」は、漢方の古典といわれる中国の医書「^{センメイロン}宣明論」に収載されている薬方です。
- 便秘がちで、腹部に皮下脂肪が多い方の肥満症、肥満に伴う便秘などに効果があります。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
- 1.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の瀉下薬(下剤)
 - 2.授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください



相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人
(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
(4)胃腸が弱く下痢しやすい人
(5)発汗傾向の著しい人
(6)高齢者
(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
(8)次の症状のある人
むくみ、排尿困難
(9)次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹部膨満、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
精神神経系	めまい
そ の 他	発汗、動悸、むくみ、頭痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

- 3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢、便秘

- 4.1ヵ月位（便秘に服用する場合には1週間位）服用しても症状が
よくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤
師又は登録販売者に相談してください

5.長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して
ください

効 能

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症：高
血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症(副鼻腔
炎)、湿疹・皮膚炎、ふきでもの（にきび）、肥満症

用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	5錠	3回
15才未満	服用しないこと	

成 分

成人1日の服用量15錠(1錠450mg)中、次の成分を含んでいます。
防風通聖散エキス…………… 6,000mg
(トウキ・シャクヤク・センキュウ・サンシシ・レンギョウ・ハッカ・
ケイガイ・ボウフウ・マオウ各1.2g、ビャクジュツ・キキョウ・
オウゴン・カンゾウ・セッコウ各2.0g、ボウショウ・ダイオウ各
1.5g、ショウキョウ0.3g、カッセキ3.0gより抽出。
添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、二酸化ケ
イ素、セルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、酸化チタン、
三二酸化鉄、カルナウバロウを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して
ください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)ビンの中の詰物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのもの
です。開栓後は不要となりますのですててください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6)水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありま
すので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<https://www.pmda.go.jp/>
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店
又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ 薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334
受付時間 10：00～17：00（土、日、祝日を除く）

ホームページ www.kracie.co.jp

発 売 元

クラシエ 薬品株式会社
東京都港区海岸3-20-20（〒108-8080）

製造販売元

クラシエ株式会社
東京都港区海岸3-20-20（〒108-8080）