



錠剤

いつでもそばに

漢方セラピー



抑肝散加陳皮半夏

T-85

ヨクカンサンカ
チンピハンゲ

クラシエの漢方

周りにあたってしまふ
怒りっぽくなってきた

イライラ

神経症、不眠症

体力中等度をめやすとして、やや消化器が
弱く、神経がたかぶり、怒りやすい、
イライラなどがある方

第2類医薬品



ビン入りの錠剤です。



T-85

このお薬の詳しい説明を
動画でチェック！

〈保管及び取扱い上の注意〉

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) ビンの中の詰物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開栓後は不要となりますので捨ててください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6) 水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。

ご使用に際して、外箱の説明文
を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように
大切に保管してください。

押して開ける

第2類
医薬品

販売名:抑肝散加陳皮半夏エキス錠クラシエ

〈成分〉成人1日の服用量12錠(1錠345mg)中
抑肝散加陳皮半夏エキス(1/2量)…2,500mg
(ハンゲ2.5g、ビャクジュツ・ブクリョウ各2.0g、
センキュウ・チンピ・トウキ・チョウトウコウ各
1.5g、サイコ1.0g、カンゾウ0.75gより抽出。)
添加物として、タルク、クロスCMC-Na、二酸化ケイ
素、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒプロ
メロース、マクロゴール、カルナウバロウを含有する。
(成分に関連する注意)本剤は天然物(生薬)のエキスを用
いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

〈効能〉体力中等度をめやすとして、やや消化器が弱
く、神経がたかぶり、怒りやすい、イライラなどがあ
るものの次の諸症:神経症、不眠症、小児夜泣き、小
児疳症(神経過敏)、更年期障害、血の道症、歯ぎしり
(注)「血の道症」とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女
性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいら
だちなどの精神神経症状および身体症状を指します。

〈用法・用量〉1日3回食前又は食間に水又は
白湯にて服用。
成人(15才以上)……1回4錠 15才未満7才以上…1回3錠
7才未満5才以上…1回2錠 5才未満は服用しないこと
(用法・用量に関連する注意)小児に服用させる場合に
は、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

発売元 製造販売元
クラシエ 薬品株式会社 大峰堂薬品工業株式会社
東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080) 奈良県大和高田市根成柿574(〒635-0051)
ホームページ www.kracie.co.jp

お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334
受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度
の問合せ先
☎0120-149-931

△ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録
販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 胃腸の弱い人
(4) 今までに薬などにより発疹・発赤、か
ゆみ等を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副
作用の可能性があるので、直ちに服用を
中止し、この文書を持って医師、薬剤師又
は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 1ヵ月位(小児夜泣きに服用する場合には1
週間位)服用しても症状がよくなる場合
は服用を中止し、この文書を持って医師、
薬剤師又は登録販売者に相談してください