

ビタミン含有保健薬

滋養強壮、
肉体疲労時の栄養補給

キューピーコーワゴールドA

キューピーコーワゴールドAは滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給におすすめのビタミン剤です。

- 製品特長
- L-アルギニン塩酸塩、ガンマ-オリザノール、滋養強壮効果を持つニンニク抽出成分オキソアミジン末
の他、7種のビタミンを同時配合し、からだに疲れを感じたときによく効きます。
 - 朝でも夜でも1回1錠で、よく効きます。
- このような方に
- 疲れて調子が出ない方に。
 - 疲れたときの栄養補給がしたい方に。

⚠ 使用上の注意

相談すること

①次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。

(2)妊娠3ヵ月以内の妊婦、妊娠していると思われる人又は妊娠を希望する人。
(妊娠3ヵ月前から妊娠3ヵ月までの間にビタミンAを1日10,000国際単位以上摂取した妊婦から生まれた児に先天異常の割合が上昇したとの報告があります。)

②次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐

(2)1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

③次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、
服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

下痢

効能・効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法・用量

下記の量を水又は温湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1錠 〇	1～2回
15歳未満の小児	✕ 服用しないこと	

- 朝・昼・晩、食前・食後にかかわらず、いつでも服用できます。
(1日2回服用する場合は、1回目の服用から6時間以上間隔をあけられることをおすすめします。)

<用法・用量に関連する注意>

用法・用量を守ってください。

(他のビタミン等を含有する製剤を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意してください。)

成分・分量 (2錠中)

成分・分量		働 き
L-アルギニン塩酸塩	50.0mg	アミノ酸の一種で、からだに元気がない時、エネルギー源の合成・貯蔵を促進します。
ガンマ-オリザノール	10.0mg	自律神経の調整に関与します。
オキソアミジン末	50.0mg	ニンニクから抽出された成分で、ニンニク特有のニオイがおさえてあり、からだの調子が悪い時、すぐれた滋養強壮効果をあらわします。
チアミン硝化物(V.B ₁)	10.0mg	7種のビタミンの補給により、疲労などへの効果をサポートします。
リボフラビン(V.B ₂)	4.0mg	
ピリドキシン塩酸塩(V.B ₆)	10.0mg	
トコフェロールコハク酸エステルカルシウム 〔dl-α-トコフェロールコハク酸エステル(V.E)として	20.7mg 20mg〕	
ビタミンA油(V.A)	2.0mg (2000ビタミンA単位)	
L-アスコルビン酸ナトリウム 〔L-アスコルビン酸(V.C)として	112.6mg 100mg〕	
ニコチン酸アミド	25.0mg	
無水カフェイン	50.0mg	中枢神経に働いて、疲れに効きます。

[添加物]セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、トウモロコシデンプン、ステアリン酸Mg、ケイ酸Ca、硬化油、タルク、ヒプロメロース、炭酸Ca、アラビアゴム、ゼラチン、白糖、酸化チタン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、リン酸水素Na、カルナウバロウ、黄色五号、トウモロコシ油、BHT

<成分・分量に関連する注意>

ビタミンB₂(リボフラビン)により、尿が黄色になることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- ① 高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。

② 小児の手の届かない所に保管してください。

③ 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

④ 水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じたりすることがありますので、水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。誤って錠剤をぬらした場合は、ぬれた錠剤を廃棄してください。

⑤ ビンの中の詰め物(ビニール)は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するために入れてあるもので、キャップをあけた後は、必ず捨ててください。

⑥ ビンのキャップのしめ方が不十分な場合、湿気などにより、品質に影響を与える場合がありますので、服用のつどキャップをよくしめてください。

⑦ 容器の落下等の衝撃により錠剤に亀裂が入り、品質に影響を与えることがありますので、外箱に入れて保管するなど、取扱いに注意してください。

⑧ 外箱及びラベルの「開封年月日」記入欄に、キャップをあけた日付を記入してください。

⑨ 使用期限(外箱及びラベルに記載)をすぎた製品は服用しないでください。また、一度キャップをあけた後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安に服用してください。
- 

本製品に関するお問い合わせ

お買い求めのお店又は下記へお願いします。

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566

受付時間：月～金(祝日を除く)9：00～17：00

●興和製品サイト <https://hc.kowa.co.jp/otc>