

乾燥性皮膚用薬

ケラチナミン^{ショウワ}乳状液20

ケラチナミン^{ショウワ}乳状液20は、カサカサかゆみ肌の治療薬です。

製品特長

- 「かゆみ止め成分」のジフェンヒドラミン塩酸塩がかゆみをすばやく抑えます。
- 「抗炎症成分」のグリチルレチン酸が炎症を鎮め、かゆみのもとの発生を抑えます。
- 「保湿成分」の尿素20%が体内の水分を集めてうるおいを保ち、肌保護ベール(基剤成分)が皮膚表面をしっとりと包みます。



かゆみを抑えながら保湿し、かゆみをくり返さない肌に改善していきます。

このような方に[以下のような乾燥肌のかゆみに]

- 暖房や入浴などによる皮膚の温度変化によりかゆみが出やすい方に。
- 衣服が触れただけのわずかな刺激でもかゆみが出やすい方に。
- かくことで症状が悪化し、一度かゆみが出ると止まらなくなり、かゆみをくり返すなどの悪循環に陥っている方に。

かゆみの出やすい
乾燥肌

バリア機能が正常な
かゆみの出にくい肌



<イメージ図>



△使用上の注意

×してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1)目のまわり、粘膜等。
- (2)引っかき傷等のきずぐち、亀裂(ひび割れ)部位。
- (3)かさぶたの様に皮膚がはがれているところ。
- (4)炎症部位(ただれ・赤くはれているところ)。



相談すること

- ① 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

- ② 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(いたみ、熱感、ぴりぴり感)、はれ、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態

- ③ 2週間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

かゆみを伴う乾燥性皮膚(成人・老人の乾皮症)

(裏面へ続く)

用法・用量

1日数回適量を患部に塗擦してください。

<用法・用量に関する注意>

- ①用法・用量を守ってください。
- ②目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- ③小児(15歳未満)には使用させないでください。
- ④外用にのみ使用してください。
- ⑤化粧品ではありませんので、効能・効果で定められた患部のみに使用し、基礎化粧等の目的で顔面には使用しないでください。


成分・分量(100g中)

成 分	分 量	働 き
尿 素	20.0g	体内の水分を皮膚に取りこんで、皮膚をしっとりなめらかにします。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.0g	かゆみを鎮めます。
グリチルレチン酸	0.3g	皮膚の炎症を鎮めます。

[添加物]ワセリン、ステアリルアルコール、オリブ油、グリセリン、カルボキシビニルポリマー、キサンタンガム、スクワラン、ミリスチン酸オクチルドデシル、ポリソルベート60、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ステアリン酸ソルビタン、エデト酸Na、DL-アラニン、グリシン、クエン酸、水酸化Na

保管及び取扱い上の注意

- ①本剤のついた手で、目など粘膜に触れないでください。
- ②高温を避け、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- ③小児の手の届かない所に保管してください。
- ④他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ⑤使用期限(外箱及び容器に記載)をすぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。



本製品に関するお問い合わせ

お買い求めのお店又は下記へお願いします。

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
受付時間：月～金(祝日を除く)9:00～17:00

●興和製品サイト <https://hc.kowa.co.jp/otc>



製造販売元 興 和 株 式 會 社 〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14