

のどの荒れと痛みに
噴射式口腔咽喉薬 **フィニッシュ**

フィニッシュは、かぜや声の出し過ぎが原因で起こる、のどの痛みや不快感などにすぐれた効果を発揮するのど用治療薬です。患部に噴射すると殺菌成分が直接当たり、のどを正常な状態に治します。

- のどに炎症をおこすかぜ等の菌を直接退治してハレと痛みをとります。
- 声の出し過ぎや乾燥した空気で荒れてしまったのどを気持ちよく治します。

⚠使用上の注意

❌してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

①次の人は使用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

②長期連用しないでください



相談すること

①次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (2) 授乳中の人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。 口中のひどいただれ
- (5) 次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害

②使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

③5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

のどの炎症によるのどのあれ・のどのいたみ・のどのはれ・のどの不快感・声がれ

成分・分量(1mL中)

ポビドンヨード 4.5mg

[添加物] l-メントール、ヨウ化K、グリセリン、エタノール

<成分・分量に関連する注意>

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。

用法・用量



1日数回適量をのどの粘膜面に噴射塗布してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- ①用法・用量を守ってください。
- ②息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがありますので、ノズルをのどの患部にむけて、ア〜ツと声を出しながら、プュープューと2〜3回直射してください。
- ③目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- ④小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- ⑤塗布にのみ使用してください。



＜容器の使い方＞ ■この容器はポンプストッパーがついており、ノズルを反対方向にまわさないと、液が出ないようになっています。

- ① 
まず、このままの状態で、必ずキャップをはずしてください。
 - ② 
ノズルを反対方向にまわすと、ポンプが作動状態になります。
 - ③ 
頭部を押しながら、液を患部に2〜3回直射してください。
 - ④ 
使用後は、ノズルをもとの位置にもどしてからキャップをはめてください。
- ※最初にお使いになるときは、液が出るまで4〜5回押してください。
※ノズルがもとの位置にもどっていなかったり、キャップがしっかりはまっていないと、キャップがはずれたり、液もれするおそれがありますので注意してください。

保管及び取扱い上の注意

- ①高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- ②小児の手の届かない所に保管してください。
- ③他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ④本剤が衣類や寝具などに付着し、汚れた場合にはなるべく早く水か洗剤で洗い落としてください。
- ⑤プラスチック類、塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- ⑥火気に近づけないでください。
- ⑦液が出なくなったり、不衛生になりますので、キャップをしっかりとめ、ゴミが付着しないようにしてください。
- ⑧キャップをしたまま噴射すると、キャップを飲みこむおそれがありますので、必ずキャップをとってから噴射してください。
- ⑨使用期限(外箱及び容器に記載)をすぎた製品は使用しないでください。



フィニッシュコーワを携帯する時は、添付のグリーンの袋に入れてください。



本製品に関するお問い合わせ

お買い求めのお店又は下記へお願いします。

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
受付時間：月～金(祝日を除く)9:00～17:00

●興和製品サイト <https://hc.kowa.co.jp/otc>



製造販売元 興和株式会社

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14