

かゆみ・虫さされ用薬 **ウナクールパンチ**

ウナクールパンチは、塗った瞬間広がる冷却感で、蚊などによる虫さされのほてりを鎮め、かゆみをもとから抑え、すばやく効くかゆみ止めです。

製品特長

- *l*-メントール配合で、ほてった患部に清涼感を与える、かゆみをやわらげます。
- 有効成分のリドカインがかゆみの伝わりをブロックし、ジフェンヒドラミン塩酸塩がかゆみのもととなるヒスタミンの働きを抑えます。
- 先端にブラシ状の「もろこしほしヘッド[®]」を採用しており、虫さされの小さな患部にもピンポイントに塗布できます。

もろこしほしヘッド[®]採用



⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1) 創傷面。
- (2) 目や目の周囲、粘膜等。



相談すること

- ① 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 湿潤やただれのひどい人。

- ② 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み

- ③ 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

成分・分量(1mL中)

成分・分量	働 き
ジフェンヒドラミン 塩酸塩 20.0mg	かゆみのもととなるヒスタミンの働きを抑え、かゆみを鎮めます。
リドカイン 10.0mg	かゆみの伝わりを止め、かゆみを鎮めます。
<i>l</i> -メントール 40.0mg	患部に清涼感を与え、かゆみをやわらげます。
<i>dl</i> -カンフル 20.0mg	

[添加物] ノニル酸ワニリルアミド、エデト酸Na、エタノール

効能・効果

かゆみ、虫さされ

用法・用量

1日数回適量を患部に塗布してください。

<用法・用量に関する注意>

①用法・用量を守ってください。②小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。③目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。④外用にのみ使用してください。⑤薬剤塗布後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。また、ひざの裏やひじの内側等に使用する場合は、皮膚を密着(正座等)させないでください。

○入浴や運動の前後の使用は、刺激を強く感じことがありますので皮膚の弱い人は注意してください。刺激が強すぎる場合は、水か石けんで洗い流してください。

[容器の使い方と注意]

①キャップを開いた後、ベージュ色のブラシカバーを真上に取りはずしてから患部に塗布してください。

ブラシカバーは
すべてください。



②容器を逆さにし、患部にブラシを軽く押しあてるとき液が出てくる構造になっています。

ブラシがになると
液が出てきます。

皮膚を傷つけるおそれがありますので、強くこすらないでください。

③キャップをしめると、ブラシ部分が押しさがり、液が出てこない構造になっています。



液もれを防ぐため、キャップを
しっかりしめてください。

※ブラシ部分にゴミ等が入り込んだり、付着した場合は、ティッシュペーパー等で取りのぞいてください。※キャップをきちんとしめ、ゴミ等が付着しないように、注意してください。

保管及び取扱い上の注意

- 高温を避け、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 本剤のついた手で、目など粘膜に触れないでください。
- 容器が変形するおそれがあるので、車の中など、高温になる場所に放置しないでください。容器の変形により、ブラシ部分の脱落や、液もれがおこるおそれがありますので注意してください。
- 本剤が衣類や寝具などに付着し、汚れた場合にはなるべく早く水か洗剤で洗い落としてください。
- メガネ、時計、アクセサリーなどの金属類、衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- 火気に近づけないでください。
- 使用期限(外箱及び容器に記載)をすぎた製品は使用しないでください。



本製品に関するお問い合わせ

お買い求めのお店又は下記へお願いします。

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
受付時間：月～金(祝日を除く)9:00～17:00

●興和製品サイト <https://hc.kowa.co.jp/otc>



製造販売元 興和株式会社

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

Languages

English

简体字

繁體字

한국어

<https://hc.kowa.co.jp/otc/tenpu>

