

NEW

アンメルツ<sup>®</sup>J

持続ゲル

## 第3類医薬品

## ■ 保管および取扱い上の注意 ■

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところ(冷暗所)にキャップをしっかりとめて保管すること
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 火気に近づけないこと(エタノール含有物)

- プラスチック製品(眼鏡わく、くし、便座など)、化繊の衣類、木材(塗料塗り家具、床など)、皮革などにゲルがつくと損耗したり、シミになることがあるので注意すること

## 火気厳禁

引火性固体 危険等級Ⅲ  
エタノール含有物

MADE IN JAPAN

上段：使用期限(西暦年・月)

下段：製造番号

副作用被害救済制度  
☎0120-149-931

販売名：  
ニューアンメルツJ  
External  
Anti-Inflammatory  
/ Analgesic

第3類  
医薬品

外用消炎鎮痛剤

使用に際して、この説明書を必ずお読みください  
また必要なときに読めるよう大切に保管してください  
使用期限(パッケージ側面およびチューブ底に記載)  
を過ぎた製品は使用しないこと

## 特 徴

- ① 消炎鎮痛成分サリチル酸グリコールが患部に浸透し、つらい肩こり、筋肉痛を治療していきます
- ② 血行促進成分ノナン酸バニリルアミドが、じんじんという温かな実感とともに、滞った患部の血流を改善し、肩こりや筋肉痛を和らげます
- ③ 患部にしっかり塗り込める、サラサラ清涼感のあるゲル剤です
- ④ ニオイが気にならない無臭性です

- スポーツや入浴など、汗をかく前・後に使用した場合、ヒリヒリとした刺激、痛みや熱感が増すことがあります。これらの症状が強い場合は、石けんで洗い流すと緩和します

## ⚠ 使用上の注意

## ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

(1) 目の周囲、粘膜など (2) 湿疹、かぶれ、傷口



## 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状          |
|------|--------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ、痛み |

3. 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

あったら  
いいな  
をカタチにする

小林製薬

## 効能・効果

肩こり、筋肉痛、筋肉疲労、腰痛、打撲、捻挫、関節痛

## 用法・用量

1日数回、患部に適量を塗擦してください

&lt;用法・用量に関連する注意&gt;

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- (3) 外用にのみ使用すること
- 塗擦部位をラップフィルムなどの通気性の悪いもので覆わないこと
- 皮膚の特に弱い人は、同じところに続けて使用しないこと

## 成分・分量 100g 中

サリチル酸グリコール 1500mg  
(消炎鎮痛成分)  
L-メントール 6000mg  
(局所鎮痛成分)  
ニコチン酸ベンジルエステル 10mg  
(血行促進成分)  
ノナン酸バニリルアミド 12mg  
(血行促進成分)

添加物として、カルボキシビニルポリマー、ヒドロキシプロピルセルロース、エタノール、マクロゴール、トリエタノールアミン、BHTを含有する

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします

発売元 小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪府中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先(お客様相談室)

☎0120-5884-01

受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製造販売元 小林製薬株式会社

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3