

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限(パッケージ側面及びチューブ底に記載)を過ぎた製品は使用しないこと



第2類医薬品
乾燥性皮膚用薬

販売名: ヒシモア

特徴

- γ -オリザノールが弱った皮脂腺のはたらきを活性化し、皮脂を作る力を回復させます
- ヘパリン類似物質が乾燥して荒れた肌組織を修復して治し、ジフェンヒドラミンがかゆみを鎮めます
- セラミド様成分※(湿潤剤)配合。肌をしっとりカバーして、べたつかないクリームです

※N-(ヘキサデシロキシヒドロキシプロピル)-N-ヒドロキシエチルヘキサデカナミド

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は使用しないこと

- (1)出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病等)の人
- (2)わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがある)
- (3)アトピー性皮膚炎の人(軽い症状であっても医師の下で適切な治療を受ける必要がある)



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3)湿潤やただれのひどい人
- (4)医師からアトピー性皮膚炎と診断されたことのある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(裏面につづく)

効能・効果

乾皮症、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、小児の乾燥性皮ふ、手指の荒れ、しもやけ(ただれを除く)、きず・やけどのあとの皮ふのしこり・つっぱり(顔面を除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

用法・用量

1日1～数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼなどにのばして貼ってください

<用法・用量に関連する注意>

- (1)使用のつどキャップをしっかりとしめること
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- (3)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- (4)外用にのみ使用すること

成分・分量

100g中

成分	分量	はたらき
ヘパリン類似物質	0.3g	角質に潤いと柔軟性を与え、肌のバリア機能を改善します
ジフェンヒドラミン	0.5g	抗ヒスタミン作用で、かゆみの発生を抑えます
ガンマ-オリザノール	1.0g	皮脂腺の働きを活性化し、皮脂分泌を高めます

添加物として、ワセリン、スクワラン、流動パラフィン、ミリスチン酸イソプロピル、ジメチルポリシロキサン、1,3-ブチレングリコール、プロピレングリコール、2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体、N-(ヘキサデシロキシヒドロキシプロピル)-N-ヒドロキシエチルヘキサデカナミド、セタノール、ステアリルアルコール、ポリソルベート60、自己乳化型ステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、カルボキシビニルポリマー、エデト酸Na、パラベン、トリエタノールアミン、pH調節剤を含有する

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
 - (2)小児の手の届かない所に保管すること
 - (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- 衣類に付着すると、まれに黄ばみを生じることがあるので注意すること

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 **小林製薬株式会社**
〒541-0045 大阪府中央区道修町4-4-10
ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製品のお問合せ先(お客様相談室)
0120-5884-01
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 **小林製薬株式会社**
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3