

無臭性



肩こりの痛みに

アンメルツ ゴールドEX

フェルビナク3%
+血行促進成分



イメージ図

肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛

第2類医薬品



販売名:
アンメルツ ゴールド EX
External Anti-Inflammatory / Analgesic

第2類医薬品

外用鎮痛消炎剤

—【成分・分量】100mL中—

フェルビナク.....3g
L-メントール.....6g
ノナン酸バニリルアミド...12mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩
.....100mg
添加物として、グリチルレチン
酸、プロピレングリコール、ジイ
ソプロパノールアミン、pH調節
剤、BHT、エタノールを含有する

—【用法・用量】—

1日2~4回、適量を患部に
塗布してください

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)目に入らないように注意する
こと。万一、目に入った場合には、
すぐに水又はぬるま湯で洗うこ
と。なお、症状が重い場合には、
眼科医の診療を受けること(2)外
用にのみ使用すること●塗布部
位をラップフィルム等の通気性
の悪いもので覆わないこと●皮
ふの特に弱い方は、同じ所に続け
て使用しないこと●スポーツや
入浴等、汗をかく前・後に使用し
た場合、ヒリヒリとした刺激、痛み
や熱感が増すことがあります。こ
れらの症状が強い場合は、石け
んで洗い流すと緩和します

MADE IN JAPAN

火気厳禁 第二石油類 危険等級Ⅲ
エタノール含有物

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

10184339

使用に際して、この説明書
きを必ずお読みください
また必要なときに読めるよ
う大切に保管してください
使用期限(箱底面及び容
器底面に記載)を過ぎた製
品は使用しないこと

—【効能・効果】—

肩こりに伴う肩の痛み、筋
肉痛、腰痛、関節痛、腱鞘炎
(手・手首・足首の痛みと腫
れ)、肘の痛み(テニス肘な
ど)、打撲、捻挫

【保管および取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない
湿気の少ない涼しい所(冷
暗所)にキャップをしっかり
しめて立てて保管すること
(2)小児の手の届かない所
に保管すること(3)他の容器
に入れ替えないこと(誤用の
原因になったり品質が変わ
る)●キャップをしっかりし
めないと液がもれることが
ある●衣類に付着した場合
には、各衣類の洗濯表示に
従って、すみやかに洗うこと
製品のお問合せは、お買い
求めのお店又はお客様相談
室にお願いいたします

発売元 小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

税 控除 対象

押して
開ける

特 徴

- ① フェルビナクが患部に浸透、痛みを鎮める
- ② 血行促進成分ノナン酸バニリルアミドがジンジン温かな実感とともに、滞った患部の血流を改善
- ③ L-メントール配合、爽快な使い心地
- ④ 手が汚れず使い易い、ヨコヨコボトル

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用
が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症
状を起こしたことがある人 (2) ぜんそくを起
こしたことがある人 (3) 妊婦又は妊娠してい
ると思われる人 (4) 15才未満の小児

2. 次の部位には使用しないこと

(1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口又
は化膿している患部



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録
販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などに
よりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副
作用の可能性があるので、直ちに使用を
中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は
登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、 かぶれ、痛み、熱感、ヒリヒリ感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある
その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
ショック (アナフィ ラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、 声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦 しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない
場合は使用を中止し、この箱を持って医
師、薬剤師又は登録販売者に相談すること