

特徴

- ① フェルビナクが患部に浸透、痛みを鎮める
- ② 血行促進成分ノナン酸バニリルアミドがジンジン温かな実感とともに、滞った患部の血流を改善
- ③ l-メントール配合、爽快な使い心地
- ④ 手が汚れず使い易い、ヨコヨコボトル

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) ぜんそくを起こしたことがある人 (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (4) 15才未満の小児

2. 次の部位には使用しないこと

(1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口 (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部

3. 長期連用しないこと



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み、ヒリヒリ感、熱感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある
その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合、使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

——【効能・効果】——

肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所(冷暗所)にキャップをしっかりとめて立てて保管すること
(2) 小児の手の届かない所に保管すること(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)●キャップをしっかりとめないと液がもれることがある●衣類に付着した場合には、各衣類の洗濯表示に従って、すみやかに洗うこと
製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 **小林製薬株式会社**

〒541-0045 大阪府中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 **小林製薬株式会社**

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

税 控除 対象

あったらいいな

をカタチにする

小林製薬

販売名:

アンメルツヨコヨコEX

External Anti-Inflammatory / Analgesic

第2類医薬品

外用鎮痛消炎剤

——【成分・分量】100mL中——

フェルビナク……………3g

l-メントール……………6g

クロルフェニラミンマレイン酸塩……………0.1g

ノナン酸バニリルアミド…12mg

添加物として、グリチルレチン酸、プロピレングリコール、ジイソプロパノールアミン、pH調節剤、BHT、エタノールを含有する

………

………

………

………

——【用法・用量】——

1日2~4回、適量を患部に塗布してください

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること(2) 外用にのみ使用すること●塗布部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないこと●皮膚の特に弱い方は、同じ所に続けて使用しないこと●スポーツや入浴等、汗をかく前・後に使用した場合、ヒリヒリとした刺激、痛みや熱感が増すことがあります。これらの症状が強い場合は、石けんで洗い流すと緩和します

MADE IN JAPAN

火気厳禁 第二石油類 危険等級Ⅲ
エタノール含有物

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

10215517