



小林製薬

開け口

開け口

漢方

ボーコレン  
エージ<sup>プラス</sup>

第2類医薬品

販売名:ボーコレンエージ+ 猪苓湯合四物湯錠

成分・分量 1日量(15錠)中 猪苓湯合四物湯エキス 3300mg


トウキ 1.5g、シャクヤク 1.5g、センキュウ 1.5g、ジオウ 1.5g、チョレイ 1.5g、  
ブクリョウ 1.5g、カッセキ 1.5g、タクシャ 1.5g、ゼラチン 1.5g より抽出

添加物として、二酸化ケイ素、CMC-Ca、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mg、タルク、  
セルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、カルナウバロウを含有する

●本剤は天然物(生薬)を用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります



をカタチにする



開け口

開け口

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりとめること

チャック

服用に際して、この説明書きを必ずお読みください。使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

販売名: ボーコレンエージ+ 猪苓湯合四物湯錠 漢方製剤 第2類医薬品

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人 (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 2. 服用後、右の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このパウチを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、このパウチを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること: 下痢 4. 1ヶ月位服用しても症状がよくなるしない場合は服用を中止し、このパウチを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

効能・効果 体力に関わらず使用でき、皮ふが乾燥し、色つやが悪く、胃腸障害のない人で、排尿異常があり口が渇くものの次の諸症: 排尿困難、排尿痛、残尿感、頻尿

用法・用量 次の量を食前又は食間に水又はお湯で服用してください

年齢	1回量	服用回数
大人(15才以上)	5錠	1日3回
15才未満	× 服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>  
定められた用法・用量を厳守すること  
●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2~3時間のことをいいます

保管及び取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをしっかりとめて保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 他の容器に入れ替えないこと (誤用の原因になったり品質が変わる) (4) 本剤をぬれた手で扱わないこと (錠剤がぬれると変色する可能性があります)

製品のお問合せは、お買い求めのお店  
又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 小林製薬株式会社  
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01  
9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社  
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN  
10220385