

# 長引く咳 治療薬

漢方

# ゴホナース

気管の奥の  
炎症を鎮め、  
過敏な気管を  
正常化し  
咳を抑える



体力中等度以上で、せきが出て、ときにのどが渇くものの次の諸症：  
せき、気管支ぜんそく、気管支炎、感冒



第2類医薬品



実物大

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

＼あったらいいな／をカタチにする

発売元 小林製薬株式会社  
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

**0120-5884-01**

9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社  
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

販売名:ゴホナース  
漢方製剤

第2類医薬品

Medicine for Cough and Bronchial Asthma



服用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要  
なときに読めるよう大切に保管  
してください。使用期限を過ぎ  
た製品は服用しないこと

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相  
談すること (1)医師の治療を受けている人 (2)妊婦又  
は妊娠していると思われる人 (3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い  
人) (4)胃腸の弱い人(5)発汗傾向の著しい人 (6)高齢者 (7)次の症状のある  
人:むくみ、排尿困難(8)次の診断を受けた人:高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機  
能障害 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直  
ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症状             |
|------|----------------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ      |
| 消化器  | 吐き気、食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

| 症状の名称               | 症状                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| 偽アルドステロン症、<br>ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加<br>えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる |

3. 1ヶ月位(感冒に服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくなる場合  
は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

体力中等度以上で、せきが出  
て、ときにのどが渇くものの  
次の諸症:せき、小児ぜんそく、気管支ぜんそ  
く、気管支炎、感冒、痔の痛み

MADE IN JAPAN  
副作用被害救済制度  
☎ 0120-149-931

税 控除 対象  
10217241

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい  
所に保管すること(2)小児の手の届かない所に  
保管すること(3)他の容器に入れ替えないこと  
(誤用の原因になったり品質が変わる)

成分・分量

1日量(6錠)中 麻杏甘石湯エキス 800mg  
[マオウ 2.0g、カンゾウ1.0g、キョウニン  
2.0g、セッコウ 5.0gより抽出] 添加物として、二酸化ケイ素、  
クロスCMC-Na、タルク、ステアリン酸Mg、セルロースを  
含有する ●本剤は天然物(生薬)を用いているため、錠剤  
の色が多少異なることがあります

風邪等が治っても咳が長引く方  
の医薬品です。喘鳴、呼吸困難を  
感じる場合は本品を使用せず、  
医師の診察を受けてください。

用法・用量

大人(15才以上)1回3錠、1日2回食前又は食間に水又は  
お湯で服用してください(15才未満は服用しないこと)  
〈用法・用量に関連する注意〉定められた用法・用量を厳守すること ●食間と  
は「食事と食事の間」を意味し、食後約2~3時間のことをいいます