

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

カユホホワイト

販売名:カユホホワイト

第②類医薬品 鎮痒消炎薬

⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと

水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部

2. 顔面には、広範囲に使用しないこと

3. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人

(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

(4) 患部が広範囲の人

(5) 湿潤やただれのひどい人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚 (患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(裏面につづく)

効能・効果

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください

＜用法・用量に関連する注意＞

(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること

(2)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと

なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること

(3)外用にのみ使用すること

成分・分量 100g 中

プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル 0.15g ジフェンヒド
ラミン塩酸塩 2g リドカイン 3g トコフェロール酢酸エステル
0.5g クロタミトン 5g イソプロピルメチルフェノール 0.1g
l-メントール 2.5g dl-カンフル 1g

添加物として、1,3-ブチレングリコール、セトステアリルアルコール、
流動パラフィン、ワセリン、ジメチルポリシロキサン、トリイソオクタ
ン酸グリセリン、ニコチン酸アミド、BHT、CMC-Na、ポリオキシエチ
レン硬化ヒマシ油、ステアリン酸ソルビタン、エデト酸 Na、パラベン、
pH 調節剤、クエン酸 Na を含有する

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管する
こと

(2)小児の手の届かない所に保管すること

(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 **小林製薬株式会社**
〒541-0045 大阪府中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室
0120-5884-01
9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 **小林製薬株式会社**
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN

10216693