

長引く咳 治療薬

漢方 ゴホナース

気管の奥の
炎症を鎮め、
過敏な気管を
正常化し
咳を抑える



体力中等度以上で、せきが出て、ときにのどが渇くものの次の諸症：
せき、気管支ぜんそく、気管支炎、感冒



第2類医薬品



実物大

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

＼あったらいいな／をカタチにする

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪府中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社
〒562-0029 大阪府箕面市彩都薬生北4-66

販売名:ゴホナース
漢方製剤

押して開ける

第2類医薬品

Medicine for Cough and Bronchial Asthma

服用に際して、この説明書
きを必ずお読みください。
また必要なときに読めるよ
う大切に保管してください。
使用期限を過ぎた製品
は服用しないこと

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相
談すること (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又
は妊娠していると思われる人 (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い
人) (4) 胃腸の弱い人 (5) 発汗傾向の著しい人 (6) 高齢者 (7) 次の症状のある
人: むくみ、排尿困難 (8) 次の診断を受けた人: 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺
機能障害 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、
直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加 えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる

3. 1ヶ月位(感冒に服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくなりな
い場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談す
ること 4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

体力中等度以上で、せ
きが出て、ときにのどが
渴くものの次の諸症: せき、小児ぜん
そく、気管支ぜんそく、気管支炎、感
冒、痔の痛み

MADE IN JAPAN
副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

税 控除 対象

10235581

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼し
い所に保管すること(2) 小児の手の届かない
所に保管すること(3) 他の容器に入れ替えな
いこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

成分・分量

1日量(6錠)中 麻杏甘石湯エキス 800mg
[マオウ 2.0g、カンゾウ 1.0g、キョウニン
2.0g、セッコウ 5.0gより抽出] 添加物として、二酸化ケイ素、
クロスCMC-Na、タルク、ステアリン酸Mg、セルロースを
含有する ●本剤は天然物(生薬)を用いているため、錠剤
の色が多少異なることがあります

用法・用量

大人(15才以上) 1回3錠、1日2回食前又は食間
に水又はお湯で服用してください(15才未満は
服用しないこと) (用法・用量に関連する注意) 定められた用法・用量
を厳守すること ●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2~3
時間のことをいいます

風邪等が治っても咳が長引く方の
医薬品です。喘鳴、呼吸困難を感じ
る場合は本品を使用せず、医師の
診察を受けてください。