

第2類医薬品

結膜炎・ものもらいに
サンテ® 抗菌新目薬

持続性サルファ剤(スルファメトキサゾール)配合

sante®antibacterial new eye drops

目が赤い、ゴロゴロする、目やにが出る、まぶたの縁や裏側の一部が化膿して痛い…。

結膜炎は細菌が原因で起こることが多く、ものもらいはまぶたの皮脂腺やまつげの根元に細菌が入り込んで、化膿性の炎症を起こす目の疾患です。

サンテ抗菌新目薬は、抗菌剤である持続性サルファ剤(スルファメトキサゾール)を配合した目薬です。粘稠化剤(ヒプロメロース)を配合して目の中の滞留時間を長くしたことにより、スルファメトキサゾールの抗菌力を高めました。さらに、目のかゆみ、炎症、組織代謝に有効な3つの成分も配合しました。結膜炎やものもらいの改善にお役立てください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

＊1. 次の人は使用しないでください。

本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

(1) 医師の治療を受けている人

(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

(3) 次の症状のある人: はげしい目の痛み

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

＊まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。

その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる

3. 3～4日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

用法・用量

1回1～2滴、1日3～5回 点眼してください。

●次の注意事項をお守りください。

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(2) 容器の先を、目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください(目やにや雑菌などの混入のため、薬液が汚染または混濁することがあります)。また、混濁したものは使用しないでください。

(3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。

(4) 点眼用にのみ使用してください。



裏面につづく

効能・効果

結膜炎(はやり目)、ものもらい、眼瞼炎(まぶたのただれ)、目のかゆみ
「ものもらい」についての注意：まぶたをこすったり、その他、目に刺激を加えないように注意してください。(なお、ものもらいは体質的に起こりやすい場合がありますが、過労や睡眠不足などで体力が低下しているときに起こりやすいので疲労をさけ、睡眠を十分とるよう心掛けてください。)

成分・分量

成 分	分 量	はたらき
スルファメトキサゾール (抗菌成分)	4.0%	持続性サルファ剤で、結膜炎やものもらいの原因菌に抗菌作用を示します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.03%	ヒスタミンの働きを抑え、目の充血・かゆみなどを抑えます。
グリチルリチン酸二カリウム	0.25%	目の炎症を抑えます。
タウリン	0.5%	目の組織代謝を活発にします。

添加物として、エデト酸ナトリウム水和物、ヒプロメロース、ベンザルコニウム塩化物、pH調節剤を含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は点眼後、ときに口中に苦味または甘味を感じることがあります。これは主成分スルファメトキサゾールおよびグリチルリチン酸二カリウムが、涙道を通して口中に流れ出てくることによるもので、品質などの異常によるものではありません。

保管及び取扱い上の注意


- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
製品の品質を保持するため、自動車の中や暖房器具の近くなど高温となる場所に放置しないでください。
また、高温となる場所に放置したものは、容器が変形して薬液が漏れたり薬液の品質が劣化しているおそれがありますので、使用しないでください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

(4) 他の人と共用しないでください。

(5) 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はできるだけ速やかに使用してください。

(6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の点眼口周囲やキャップの内側に白くつくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふき取って使用してください。
- 

包 装 12mL

〔自然環境に配慮し、携帯袋は添付しておりません。ご理解の程お願い申し上げます。〕

お問い合わせ先

商品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

参天製薬株式会社「お客様相談室」 電話番号 0120-127-023
受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

お問い合わせ内容の正確性を期すため、また、回答の質の維持・向上のため、お電話を録音させていただいております。

