



ポビドンヨード配合



細菌・ウイルス
殺菌・消毒

第3類医薬品

うすめず
使える

イソジン®
うがい薬C
スッキリ清涼感

この説明文書は使用前に必ずお読みください。

イソジン®うがい薬C 第3類医薬品

特徴 清涼化剤(メントール(添加物)と、すっきり感をアップさせる香料(添加物)配合。お口とのどに、スッキリ清涼感強めのイソジンうがい薬です。

△使用上の注意

【してはいけないこと】☒ (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が
おこりやすくなります) 次の人は使用しないでください 本剤または本剤の
成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人

【相談すること】■ 1. 次の人は医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者
にご相談ください (1) 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
(2) 口内のひどいただれのある人 (3) 甲状腺機能障害の診断を受けた人

2. 使用後、右の症状があら
われた場合は副作用の可能
性があるので、直ちに使用を
中止し、この容器を持って医
師、歯科医師、薬剤師または
登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師
の診療を受けてください。


症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、 声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、 動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この
容器を持って医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

お問い合わせ
窓 口 大阪 06-6209-6948
東京 03-3406-8450
受付時間9時～17時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

®: イソジン
はアイノヴァ
ファーマの登
録商標です。



- キャップの内側に目盛
りがついています。
- 内溶液は茶色です。
- 本剤は、うがい以外に
使用しないでください。

【販売】
シオノギヘルスケア株式会社
大阪市中央区北浜2丁目6番18号

【製造販売元】
iNova Pharmaceuticals
Japan 株式会社
東京都中央区八丁堀4-3-5

A7639

MADE IN JAPAN

効能・効果 口腔内およびのどの
殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

用法・用量 うすめずにそのまま
適量(約15～20mL)を口に含ん
で、2～3回うがいをする。これを
1日数回行ってください。

【用法・用量に関連する注意】 ● 定
められた用法・用量を厳守してくだ
さい。 ● 小児に使用させる場合に
は、保護者の指導監督のもとに使用
させてください。 ● **本剤はうがい
用のみに使用し、キズややけどへの
使用や、内服はしないでください。**

● 目に入らないようにご注意ください。
万一、目に入った場合には、すぐ
に水またはぬるま湯で洗ってくだ
さい。なお、症状が重い場合には、
眼科医の診療を受けてください。

成分・分量 1mL中 ポビドン
ヨード3.5mg(有効ヨウ素として
0.35mg) 添加物として エタノール、
グリセリン、メントール、サッカリ
ンナトリウム、pH調整剤、香料、
その他1成分を含有しています。

【成分・分量に関連する注意】 本剤
の使用により、銀を含有する歯科
材料(義歯など)が変色することが
あります。

保管および取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に
密栓して保管してください。(2) 小
児の手の届かない所に保管してく
ださい。(3) 他の容器に入れ替えない
でください。(誤用の原因になつた
り品質が変化します。)(4) 衣服など
に付着すると着色しますのでご注
意ください。なお、付着した場合には
すぐに水でよく洗い落としてくだ
さい。(5) 使用期限をすぎた製品
は、使用しないでください。