(承認基準制定に伴う改訂)

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品



肩こり・腰痛・関節痛に

おきゅ青乙

温感プラスター(こり・鎮痛温感貼付薬)

[特 徵]

おきゅ膏 Z はこれを貼りますと、配合成分が患部皮下組織に浸透し、 一瞬しみとおるような感じがあります。そして、患部の毛細血管を拡張 して血液の循環を高め、筋肉その他の組織に快い温感を与えて、こりや 痛みを鎮めます。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 1.次の人は使用しないでください 天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2.次の部位には使用しないでください
 - (1)目の周囲、粘膜等。
 - (2)湿疹, かぶれ, 傷口。

相談すること



- 1.次の人は使用前に医師,薬剤師又は登録販売者に相談してください 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、 直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販 売者に相談してください

関係部位		症	状
皮膚	発疹·発赤,	かゆみ,	痛み

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕

腰痛、打撲(うちみ)、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労

〔用法・用量〕

1日1~2回, ライナーをはがし, 患部にはってください。


〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (4)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用して ください。
- (5)本剤を貼ってから汗をかくと強い刺激を感じるため、汗をかきそうな作業やスポーツを行う前には使用しないでください。
- (6)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm 角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ 等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (7)貼ったままあるいははがした直後に入浴すると強い刺激を感じるため、1時間以上前にはがして入浴してください。また、入浴後は30分位してから使用してください。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)開封後は袋の口を折り曲げて保管してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

症状別の貼付位置参考図



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080 〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11 受付時間 9:00~17:50 (土・日・祝日を除く)

ホームページ https://www.zeria.co.jp/

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html 電話 0120-149-931(フリーダイヤル)



発売π



ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11

製造販売元



大協薬品工業株式会社

富山市水橋畠等173