



貼るかゆみどめ

半透明
パッチ

マキロン[®] パッチエース

赤くはれた
虫さされ、かゆみに

第2類医薬品

殺菌剤配合



- 水につよく、ムレにくい
 - お子様のかきこわし防止
- デキサメタゾン酢酸エステル配合



Daiichi-Sankyo

第一三共ヘルスケア



販売元 第一三共ヘルスケア株式会社

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

製造 救急薬品工業株式会社

販売元 富山県射水市戸破32-7

使用前にこの箱の説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないで下さい。(1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部(2) 目の周囲、粘膜等(3) 傷口、湿潤(かきこわし)、ただれ、しっしん、かぶれ 2. 顔面には、広範囲に使用しないで下さい。 3. 長期連用しないで下さい。

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4) 患部が広範囲の人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感、かぶれ、色素沈着

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。



虫さされによるかゆみに
マキロンパッチエース

鎮痒消炎薬

第2類医薬品

〔成分・分量〕 本品の膏体100g(1.25m²)中

成 分	分 量	はたらき
デキサメタゾン酢酸エステル	0.025g	かゆみや炎症をおさえます。(抗炎症剤)
ジフェンヒドラミン	1.00g	かゆみをおさえます。(抗ヒスタミン剤)
イソプロピルメチルフェノール	1.00g	殺菌作用があります。(殺菌剤)
トコフェロール酢酸エステル (ビタミンE酢酸エステル)	0.50g	血行促進作用により、皮膚の新陳代謝をよくします。

添加物: アジピン酸ジイソプロピル、メタクリル酸・アクリル酸ブチルコポリマー、BHT、l-メントール

本剤は、副腎皮質ホルモン(ステロイド)のデキサメタゾン酢酸エステルを配合しています。

〔効能・効果〕 虫さされによるかゆみ

〔使用法〕 1日1～3回患部に貼って下さい。

〈使用法に関連する注意〉(1) 使用法を厳守して下さい。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用して下さい。(3) 外用にのみ使用して下さい。(4) 汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用して下さい。(5) 数時間使用してかゆみがなくなれば、本剤をはがして下さい。(6) 同じ場所に長時間の使用はしないで下さい。

〔保管及び取扱い上の注意〕(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)(4) 品質保持のため、未使用分はアルミ袋に入れ、アルミ袋の切り口をきちんと折り曲げて保管して下さい。(5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

〔包装〕 直径2.0cm

MADE IN JAPAN

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931

〈お問い合わせ先〉 第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
電 話 0120-337-336
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

®登録商標

開封
◀ □