

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。09



消化薬

指定医薬部外品

消化酵素剤

新タカヂア錠

タカヂアスターゼは、1894年に高峰譲吉博士によって発見された消化酵素です。その後の研究により、でんぷん消化力とたんぱく質消化力を併せ持つタカヂアスターゼN1へと改良されました。

新タカヂア錠の特徴

- すぐれたでんぷん・たんぱく質消化作用を有しています。
- 広いpH領域（pH3～8の範囲）で消化作用を示し、胃酸（胃液）中でも消化力が低下しません。
- タカヂアスターゼN1は、緑茶、紅茶及びコーヒーによって、でんぷん消化力にほとんど影響を受けません。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
 - (2) 2週間位服用しても症状がよくなる場合

■ 効能・効果

- 消化促進、消化不良
- 食欲不振（食欲減退）、食べ過ぎ、もたれ、胸つかえ
- 消化不良による胃部・腹部膨満感

■ 用法・用量

次の量を水又はお湯で服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
15 歳 以 上	4 錠    	3回 食後に服用して下さい。
11歳以上15歳未満	3 錠   	
8 歳以上11歳未満	2 錠  	
5 歳以上 8 歳未満	1 錠 	
5 歳 未 満	服用しないで下さい。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 5歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

■ 成分・分量

本剤は、淡灰褐色～淡褐色の錠剤で、わずかに特異なおいがあります。
12錠中に次の成分を含有しています。

成 分	分 量	はたらき
タカヂアスターゼN1	600mg	広いpH域ではたらく消化酵素で、消化を助け、栄養の吸収をよくします。

添加物：タルク、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、メタケイ酸アルミン酸Mg、デキストリン、D-マンニトール

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4) ぬれた手で取り扱わないで下さい。水分が錠剤につくと、表面が一部溶けて、変色又は色むらを生じることがあります。また、ぬれた錠剤をビンに戻すと他の錠剤にも影響を与えますので、戻さないで下さい。
- (5) ビンの中の詰め物は輸送中の錠剤破損防止用ですので、開封後は捨てて下さい。
- (6) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

電 話 0120-337-336

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

09®登録商標



製造販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋3-14-10