

貼る かゆみどめ



マキロン[®]
かゆみどめパッチP

かきこわしを
防止

ムレにくく
はがれにくい ※製法技術

- 水につよい
- 4つの有効成分配合



Dalichi-Sankyo

第一三共ヘルスケア

虫さされ
かゆみに



▲イラスト入り



第3類医薬品

※エマルジョン製法

販売元 第一三共ヘルスケア株式会社
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

製造 救急薬品工業株式会社
販売元 富山県射水市戸破32-7

使用前にこの箱の説明文書を必ずお読み下さい。

鎮痒消炎薬 マキロンかゆみどめパッチP

第3類医薬品

【効能・効果】 虫さされ、かゆみ、しもやけ

【成分・分量】 本品の膏体100g(1.25m²)中

ノンステロイド

⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないで下さい。

傷口、湿潤(かきこわし)、ただれ、かぶれ



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	色素沈着

- 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

成 分	分 量	はたらき
ジフェンヒドラミン	1.0g	かゆみをおさえます。(抗ヒスタミン剤)
グリチルレチン酸	0.5g	炎症をおさえます。(抗炎症剤)
クロタミトン	5.0g	かゆみをおさえます。(鎮痒剤)
イソプロピルメチルフェノール	1.0g	殺菌作用があります。(殺菌剤)

添加物: メタクリル酸・アクリル酸ブチルコポリマー、BHT、l-メントール
貼付後ほてり(熱感)を感じることがありますが、ごく短時間のうちに消失します。

【使用法】 パッチを台紙からはがし、1日数回患部に貼って下さい。〈使用法に関連する注意〉(1) 使用法を厳守して下さい。

(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。(3) 外用にのみ使用して下さい。(4) 汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用して下さい。(5) 同じ場所に長時間使用しないで下さい。

【保管及び取扱い上の注意】 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります) (4) 品質保持のため、未使用分はアルミ袋に入れ、アルミ袋の切り口をきちんと折り曲げて保管して下さい。(5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

【包装】 直径2.0cm

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

開封口

MADE IN JAPAN

Pocket Monsters

©Nintendo・Creatures・
GAME FREAK・TV Tokyo・
ShoPro・JR Kikaku
©Pokémon



For sale in Japan Only

〈お問い合わせ先〉 第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

電 話 0120-337-336

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

マキロンについて詳しくは www.makiron-s.jp 04®登録商標